



بانک جزوات دوازدهمی ها

دیجی کنکور، رسانه دانش آموزان موفق

ورود به بانک جزوات

برای ورود به بانک جزوات کلیک کنید

نیاز به کنکوریها +
برنامه ریزی
داری؟

آیامی دونستی؟

میدونستید دیجی کنکور، رتبه ۱ برنامه ریزی کنکور در چهار سال اخیر بوده! به ما زنگ بزن نا امیدتون نمیکنیم

۰۲۱-۰۸۴۲۴۱۰



سایت ویژه ریاضیات www.riazisara.ir

درسنامه ها و جزوه های ریاضی

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور

نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نرم افزارهای ریاضیات

و...

(@riazisara) ریاضی سرا در تلگرام:

<https://t.me/riazisara>



(@riazisara.ir) ریاضی سرا در اینستاگرام:



<https://www.instagram.com/riazisara.ir>

ریاضی ۳ به سبک روحانی



دیدار با سوالات امتحان
نهایی ریاضی ۳ تجربی

مؤلف : محمد صادق روحانی گل‌جانی



مقدمه مولف

این مجموعه شامل درسنامه‌ای کامل به همراه ۳۰۰ سؤال متنوع و حل شده از سؤالات امتحانات نهایی داخل و خارج از کشور به همراه سؤالات مفهومی و تأثیفی از متن کتاب درسیه . تمام نکات لازم برای شما ارائه شده . این کتاب با توجه به رویکرد کتاب ریاضی ۳ تدوین شده و سعی کردم کاستی‌های اونو پوشش بدم . از طرفی نحوه‌ی نوشتمن پاسخ تشریحی ، برای امتحان نهایی هم ارائه شده تا به " اندازه بنویسی و نمره سوال را کامل بگیری " . تدوین کتاب بطوریه که با استفاده از مفاهیم و سؤالات حل شده قادر به حل سؤالات بعدی باشی . ۷ آزمون شبیه سازی شده امتحان نهایی همراه با پاسخنامه کامل‌تشریحی و " توضیح دار " آوردم تا شما سوالات امتحان نهایی را قبل از برگزاری دیدار کنید .

برای موفقیت در درس ریاضی باید از حل مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی شروع کنید و به هیچ‌وجه از آن غافل نشوید سؤالات امتحانات نهایی و حتی کنکور به طور مستقیم از تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی طراحی می‌شون. آفت موفقیت شما حفظ کردن پاسخ تمرینات! تسلط بر مفاهیم مستلزم فهم درست درسه و اکتفا کردن به خواندن حل مسئله کارساز نیست، دقت کنید که حل هر سؤال برای شما کمکیه برای حل سؤالات جدیدتر و درک مفاهیم اساسی ریاضی از طریق حل مسئله . دقت به موارد زیر موفقیت شما را افزایش میده :

- ۱- بررسی موضوعات به صورت تشریحی و مفهومی و همچنین توجه به کاربرد مفاهیم و تعاریف در حل مسئله .
- ۲- یادگیری عمیق موضوعات با حوصله‌ی زیاد و اینکه روش‌های مختلف حل یه سوال را یادبگیری .
- ۳- بررسی نمونه سوالات حل شده و پس از آن حل تمرین (البته به اعتقاد من مثال‌های حل شده کتاب را هم باید اول سعی کنیم خودمون حل کنیم) و در صورت نیافتن راه حل رجوع به پاسخ . خوبه بدونید از ارش ۵۰ تمرین که خودتون حل می کنید به مراتب بیشتر از خوندن و حفظ کردن ۱۰۰ تمرین حل شده است، چون مهم‌ترین قسمت یادگیری و کاربردی‌ترین آن برای حل مسئله ریاضی مثال‌ها و تمرین‌هایی است که خودتون به حل آن می‌پردازید . فرآیند یادگیری ریاضی تدریجیه و در صورت عدم تکرار و تداوم از یاد می‌رمه، بنابراین انتظار نداشته باشید در این درس در کوتاه مدت تسلط کامل پیدا کنید بلکه این مهم آهسته و پیوسته با تمرین مطالب آموخته شده اتفاق می‌افته . تسلط و مهارت در هر درسی نتیجه تلاش مستمر و پیگیریه .

لطف کنید کمی و کاستی این کتاب را از من دریغ نکنید تا مجموعه بهتری ارائه بشه از صبر و حوصله و دقت شما سپاس بی پایان دارم از مهندس آرش آریان بابت ویراستاری و دقت نظر تشکر می‌کنم .

سپاس و عشق ، نثار همسر و فرزندانم که برای تالیف این مختصر وقت بسیاری را از ایشان دریغ داشتم .

کرج اردیبهشت ۱۳۹۸ : محمد صادق روحانی گیجانی

نمرت مطالب

فصل اول: تابع

۶	اعمال روی توابع
۹	توابع صعودی نزولی
۱۱	ترکیب توابع
۱۴	تابع وارون

فصل دوم: مثلثات

۱۷	دوره تناوب
۱۹	نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان
۲۰	نمودار توابع مثلثاتی
۲۲	معادلات مثلثاتی

فصل سوم: حد

۲۴	بخش پذیری
۲۵	مفهوم حد و حد از روی نمودار
۲۷	حدود توابع کسری و ابهام $\frac{0}{0}$
۳۲	حدود نامتناهی
۳۳	حد در بی نهایت

فصل چهارم: مشتق

۳۶	تعريف مشتق
۳۷	مشتق و پیوستگی و روش های محاسبه مشتق
۴۱	مشتق و خط مماس بر تابع
۴۲	آهنگ تغییر

فصل پنجم: کاربرد مشتق

۴۳	یکنواختی تابع و ارتباط آن با مشتق
۴۴	نقاط بحرانی و اکسٹرمم های نسبی
۴۵	اکسٹرمم های مطلق
۴۷	بهینه سازی

فصل ششم: هندسه مقاطع مخروطی

۴۸	تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی و بیضی
۵۰	دایره

فصل هفتم: احتمال

۵۲	مروری بر مبانی احتمال
۵۳	قانون احتمال کل

آزمون ها

۵۶	آزمون ۱ و پاسخنامه
۶۰	آزمون ۲ و پاسخنامه
۶۳	آزمون ۳ و پاسخنامه
۶۷	آزمون ۴ و پاسخنامه
۷۰	آزمون ۵ و پاسخنامه
۷۴	آزمون ۶ و پاسخنامه
۷۸	آزمون ۷ و پاسخنامه

بازم بندی درس ریاضیات ۳ پایه دوازدهم - سال تحصیلی : ۹۸-۱۳۹۷ قسم اول

۷	۶	۸	۴	۳	۲	۱	نهم
			۳	۵	۵	۷	

بازم بندی درس ریاضیات ۳ پایه دوازدهم - سال تحصیلی : ۹۸-۱۳۹۷ قسم دوم امتحان نهایی

۷	۶	۸	۴	۳	۲	۱	نهم
۲/۵	۴	۴	۵/۵	۱	۱/۵	۱/۵	

دوستان و دانش آموزان عزیزم به تک تک سوالات کتاب درسی حتی سوالات حل شده مراجعه و اونارو حل و بررسی کنید ۳ الی ۴ سوال از تمرينات حل شده " داخل " کتاب میاد عیناً کار در کلاس ها و فعالیت ها رو جدی بگیرید و مطمئن باشد امتحان نهائی از هر امتحانی راحتتره ، چون دقیقاً بر پایه کتاب درسی و فهم درست مطالب اون طراحی می شه .

- ۱) $(a+b)^r = a^r + r ab + b^r$
- ۲) $(a-b)^r = a^r - r ab + b^r$
- ۳) $(a+b)^r + (a-b)^r = 2(a^r + b^r)$
- ۴) $(a+b)^r - (a-b)^r = 2ab$
- ۵) $a^r + b^r = (a+b)^r - r ab$
- ۶) $a^r + b^r = (a-b)^r + r ab$
- ۷) $(a+b)(a-b) = a^r - b^r$
- ۸) $a-b = (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$
- ۹) $\forall n \in \mathbb{N} \quad (\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 1$
- ۱۰) $(a+b+c)^r = a^r + b^r + c^r + r(ab+ac+bc)$
- ۱۱) $(a+b)^r = a^r + r a^r b + r ab^r + b^r$

- ۱۲) $(a-b)^r = a^r - r a^r b + r ab^r - b^r$
- ۱۳) $(a+b)^r = a^r + b^r + r ab(a+b)$
- ۱۴) $(a-b)^r = a^r - b^r + r ab(a-b)$
- ۱۵) $a^r + b^r = (a+b)(a^r - ab + b^r)$
- ۱۶) $a^r - b^r = (a-b)(a^r + ab + b^r)$
- ۱۷) $a^r + b^r = (a+b)^r - r ab(a+b)$
- ۱۸) $a^r - b^r = (a-b)^r + r ab(a-b)$
- ۱۹) $a-b = (\sqrt[r]{a} - \sqrt[r]{b})(\sqrt[r]{a} + \sqrt[r]{ab} + \sqrt[r]{b})$
- ۲۰) $a+b = (\sqrt[r]{a} + \sqrt[r]{b})(\sqrt[r]{a} - \sqrt[r]{ab} + \sqrt[r]{b})$
- ۲۱) $(x+a)(a+b) = x^r + (a+b)x + ab$

مساحت ها، حجم ها و محیط های مهم :



$$\text{دایره : } S = \pi R^r \quad , \quad P = 2\pi R$$

$$\text{کره : } S = 4\pi R^r \quad , \quad V = \frac{4}{3}\pi R^r$$

$$\text{استوانه : } S = 2\pi Rh + 2\pi R^r \quad , \quad V = \pi R^r h$$

$$\text{مکعب مخروط : } L^r = R^r + h^r \quad , \quad V = \frac{\pi}{3} R^r h$$

قدر مطلق



- ۱) $|u| \geq 0 \quad , \quad |u| = 0 \Rightarrow u = 0$
- ۲) $|u| = |-u| \Rightarrow |u-v| = |v-u|$
- ۳) $-|u| \leq u \leq |u|$
- ۴) $\sqrt[n]{u^n} = |u|$
- ۵) $|u| = K \xrightarrow{K > 0} u = \pm K$
- ۶) $|u| = |v| \longrightarrow u = \pm v$
- ۷) $K > 0 \Rightarrow \begin{cases} |u| \leq K \Leftrightarrow -K \leq u \leq K \\ |u| \geq K \Leftrightarrow u \geq K \quad \vee \quad u \leq -K \end{cases}$
- ۸) $\begin{cases} |uv| = |u||v| \\ \left|\frac{u}{v}\right| = \frac{|u|}{|v|} \quad v \neq 0 \end{cases}$


فصل ۱ تابع
اعمال روی توابع

$$(kf)(x) = kf(x) \Rightarrow \begin{cases} D_{kf} = D_f \\ R_{kf} = \{ky \mid y \in R_f\} \end{cases}$$

بررسی تابع $kf(x)$
برای رسم نمودار kf باید عرض هر نقطه‌ی f را در عدد k ضرب کنیم.

تابع f در راستای معمور y ‌ها با ضریب k کشیده می‌شود.	: $k > 1$
تابع f در راستای معمور y ‌ها با ضریب k غشده می‌شود.	: $-1 < k < 1$
تابع ابتدا نسبت به معمور x ‌ها آینه‌وار منعکس می‌شود، سپس با ضریب $ k $ غشده می‌شود.	: $-1 < k < 0$
تابع فقط نسبت به معمور x ‌ها آینه‌وار منعکس می‌شود.	: $k = -1$
تابع نسبت به معمور x ‌ها منعکس می‌شود، سپس با ضریب $ k $ کشیده می‌شود.	: $k < -1$

گر برای تابع $y = f(x)$ بازه‌ی $[m,n]$ باشد، آنگاه با خرض مثبت بودن k برای تابع $y = kf(x)$ می‌باشد و اگر k منفی باشد، برای تابع $y = kf(x)$ بازه‌ی $[kn,km]$ فواهر بود.

دامنه‌ی توابع $f(x) + k$, $kf(x)$, $f(x)$ پلساناند.

بررسی تابع $g(x) = f(kx)$

در این توابع دامنه تغییر می‌کند، اما برای هیچ‌گونه تغییری نمی‌کند.

$$D_f = [a,b] \Rightarrow a \leq kx \leq b \Rightarrow \begin{cases} \text{if } k > 0 \Rightarrow \frac{a}{k} \leq x \leq \frac{b}{k} \\ \text{if } k < 0 \Rightarrow \frac{a}{k} \geq x \geq \frac{b}{k} \end{cases} \Rightarrow D_g = \left\{ \frac{x}{k} \mid x \in D_f \right\}$$

$$\begin{cases} g(x) = f(kx) \\ |k| < 1 \text{ کشیدگی} \\ |k| > 1 \text{ غشیدگی} \end{cases}$$



* برای رسم $f(ax+b)$ ابتدا انتقال عدد ثابت b را انجام می‌دهیم. سپس تغییرات مربوط به ضریب x را روی شکل اعمال می‌کنیم.

برای رسم نمودار $f(ax+b)$ اگر $a < 0$ باشد نمودار تابع $f(x)$ را در راستای معمور x ‌ها با ضریب $\frac{1}{a}$ منبسط می‌کنیم. طول h برابر می‌شوند.


اگر $a > 0$ نمودار تابع $f(x)$ در راستای معمور x ‌ها با ضریب $\frac{1}{a}$ منطبق می‌شود. طول h برابر می‌شوند.



اگر نقطه A روی نمودار تابع $f(x)$ باشد نقطه نظیر آن روی تابع $g(x) = f(ax+b)$ برابر است با :

$$\text{if } A(x_0, y_0) \in f(x) \quad A' \left| \begin{array}{l} \frac{x_0 - b}{a} \\ y_0 \end{array} \right. \in g(x) = f(ax + b)$$

$$\text{if } A(x_0, y_0) \in f(x) \quad A' \left| \begin{array}{l} \frac{x_0 - b}{a} \\ ky_0 \pm k' \end{array} \right. \in g(x) = kf(ax + b) \pm k'$$





* بررسی تابع $y = f(x-a)$

برای رسم منفی آن کافی است نمودار تابع f را a واحد در امتداد مثبت محور x ها منتقل دهیم.

* بررسی تابع $y = f(x+a)$

برای رسم منفی آن کافی است نمودار تابع f را a واحد در امتداد منفی محور x ها منتقل دهیم.

۱) نمودار تابع معین $y = f(x)$ در شکل روبرو داده شده است. نمودار تابع $g(x) = f(-2x)$ را درسم کنید، سپس دامنه و برد آن را تعیین کنید.



نشرده‌گی طولی به فاصله ضربی 2 و افراد x را اقل پرانتز

تقارن طولی به قاطر منفی داصل پرانتز

$$D_g = [-1, 0], \quad R_g = [0, 1]$$


برد توابع $(x+k)$, $f(kx)$, $f(x)$ یکسان‌اند.




۲) به کمک نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \frac{1-x}{1-\sqrt{x}}$ را درسم کنید.

$$f(x) = \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} = \frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{1-\sqrt{x}} = 1 + \sqrt{x}$$


پاسخ: برای هر کاری به هز دامنه گرفتن، اول تابای ممکن تابع را ساده کنید. (ثواب داره)



هلا شکل \sqrt{x} رو یه واحد می‌بریم بالا



اینجا باختر دامنه تابع کسری، تابع سوراخ دارد





(۳) اگر نمودار $y = f(x)$ شکل رو به رو باشد، نمودار تابع $g(x) = 2f(-x)$ را رسم کنید و دامنه و برد $g(x)$ را به دست آورید.

یعنی x های دامنه را قرینه کن.

y ها رو دو برابر کن (کشیدگی عرضی)

یک واحد بیرون پایین



پاسخ:




(۴) نمودار $f(x) = 2f(2x)$ شکل مقابل است. نمودار توابع $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$ را رسم کنید.

پاسخ:


نششیدگی طولی به قاطر ضریب دو واحدی x و کشیدگی عرضی به قاطر ضریب دو واحدی f




(۵) در زیر نمودار تابع $y = f(x-3)$ رسم شده است. با استفاده از انتقال ابتدا نمودار تابع $y = f(x-3)$ را رسم کنید. (خرداد ۹۱)



پاسخ:





شکل قرینه نسبت به محور x ها رو دو واحد انبساط عرضی دارد.




(۶) ابتدا نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را رسم نموده، سپس با استفاده از آن نمودار تابع $g(x) = -2f(x-3)$ را رسم کنید. (خرداد ۹۲)

پاسخ:



۱ واحد میره پایین



توابع سعودی و توابع نزولی

تابع سعودی: تابع $y = f(x)$ را سعودی می‌نامند هرگاه با بزرگ شدن مقدار متغیر x ، مقدار تابع یعنی y نیز بزرگ شود و یا ثابت بماند.

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$



تابع $y = f(x)$ را سعودی اکید می‌نامند هرگاه با بزرگ شدن مقدار متغیر x ، مقدار تابع یعنی y نیز بزرگ شود.

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$



تابع نزولی: تابع $y = f(x)$ را نزولی می‌نامند، هرگاه با بزرگ شدن مقدار متغیر x ، مقدار تابع یعنی y کاهش یابد و یا ثابت بماند.

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$



تابع $y = f(x)$ را نزولی اکید می‌نامند، هرگاه با بزرگ شدن مقدار متغیر x ، مقدار تابع یعنی y نیز کاهش یابد.

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



۱. در هر بازه که تابع ثابت باشد، هم می‌توان گفت سعودی و هم نزولی چون در تعریف هر دو صدق می‌کنه.

۲. هر تابعی که در دامنه‌اش سعودی اکید (یا نزولی اکید) باشد، یک به یک و در نتیجه وارون پذیر است. ولی ممکن تابعی یک به

$$y = \frac{1}{x}$$



(۱) اول از $x_1 < x_2$ متعلق به دامنه تابع شروع کنید و سعی نمایید $f(x_1)$ و $f(x_2)$ بسازید.

(۲) وقت کنید کرام نامساوی برقرار است $f(x_1) \leq f(x_2)$ یا $f(x_1) \geq f(x_2)$ اولی یعنی سعودی بودن تابع و دومی یعنی نزولی بودن آن

(۷) نشان دهید تابع $R \rightarrow R$ با ضابطه $f(x) = \frac{1}{1+x}$ نزولی اکید است.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^r < x_2^r \Rightarrow 1 + x_1^r < 1 + x_2^r \Rightarrow \frac{1}{1 + x_1^r} > \frac{1}{1 + x_2^r} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

(۸) سعودی یا نزولی بودن تابع $f(x) = \sqrt{2x - 4}$ را روی دامنه‌اش بررسی کنید.

پاسخ:

$$f(x) = \sqrt{2x - 4} \Rightarrow 2x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow D_f = [2, +\infty)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 - 4 < 2x_2 - 4 \Rightarrow \sqrt{2x_1 - 4} < \sqrt{2x_2 - 4} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

تابع در دامنه‌اش سعودی است.


(۹) با استفاده از ضابطه‌ی، سعودی یا نزولی بودن تابع: $f(x) = -2(x+1)^r - 1$ را بررسی کنید.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow (x_1 + 1)^r < (x_2 + 1)^r \Rightarrow -2(x_1 + 1)^r - 1 > -2(x_2 + 1)^r - 1 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow$$

بنابراین تابع نزولی است.

۱۰) در تابع با ضابطه $f(x) = x^2 - 4x + 1$ دامنه تابع را به گونه ای محدود کنید که تابع اکیداً صعودی باشد.

پاسخ:



$$\forall x_1, x_2 \in [2, +\infty)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

راسن این سهتمی رو به بالاست و از $x = 2$ به بعد تابع صعودی است.

اینم اثباتش

چون x ها بزرگتر از ۲ اند داریم


باید نشون بردیم

$$x_1 < x_2 \Rightarrow (x_1 - 2) < (x_2 - 2) \Rightarrow (x_1 - 2)^2 < (x_2 - 2)^2 \Rightarrow (x_1 - 2)^2 - 3 < (x_2 - 2)^2 - 3$$

$$x_1^2 - 4x_1 + 1 < x_2^2 - 4x_2 + 1 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

۱) نمودار تابع را رسم کنید.

۲) برای هر بازه به صورت مجزا صعودی یا نزولی بودن را بررسی کنید.



(شهریور ۹۳)

۱۱) با رسم نمودار تابع $y = |x-1| + |x+3|$ مشخص کنید تابع در چه بازه ای صعودی و در چه بازه ای نزولی است؟

پاسخ:

$$y = |x+3| + |x-1| \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

ریشه قدر مطلق اول
ریشه قدر مطلق دوم


$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2 & x < -3 \\ 4 & -3 \leq x \leq 1 \\ 2x + 2 & x > 1 \end{cases}$$

x	-4	-3	1	2
y	6	4	4	6

$\forall x \in (-\infty, -3)$ نزولی

$\forall x \in (-3, 1]$ ثابت


$\forall x \in (1, +\infty)$ صعودی




۱۲) ابتدا نمودار تابع زیر را رسم کنید، سپس بازهایی را که در آن تابع صعودی اکید، نزولی اکید یا ثابت است را مشخص کنید. (شهریور ۹۲)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & x > 1 \end{cases}$$

پاسخ:



۱۳) تابع در بازه‌ی $(-\infty, 0)$ اکیدانزولی است در بازه‌ی $[0, 1]$ ثابت و در بازه‌ی $(1, +\infty)$ اکیداً صعودی است.



۹۰) $f(x)$ را رسم کنید و بازه‌ای که در آن تابع صعودی، نزولی یا ثابت است را مشخص کنید. (خرداد ۹۰)

۱۴) تابع $f(x) = \begin{cases} x+1 & x < -2 \\ 1 & -2 < x < 1 \\ -2x & x > 1 \end{cases}$ صعودی است و در بازه‌ی $(-\infty, -2)$ نزولی است.

پاسخ:





ترکیب توابع

اگر $f: C \xrightarrow{\text{fog}} D$ و $g: A \xrightarrow{f} B$ باشند، $C \xrightarrow{g} D$ به شکل زیر تعریف می‌شود.

$$\begin{cases} y = fog(x) = f(g(x)) \\ D_{\text{fog}} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} \end{cases}$$

اگر برد $f(x)$ و $g(x)$ اشتراکی با دامنهٔ تابع $f(x)$ نداشته باشند، $R_g \cap D_f \neq \emptyset$ قبل تشکیل نیست. هال اگر آن‌گاه با جایگزینی $f(g(x))$ به جای x در فابطهٔ f تابع fog تشکیل می‌شود.



(۹۵) شهریور

(۱۵) اگر $g = \{(-1, 0), (1, 2), (2, 4), (5, 3)\}$ و $f = \{(-1, 1), (1, 2), (2, 3), (4, 5)\}$ دو تابع باشند: تابع fog را به صورت زوج مرتب بنویسید.

$$\begin{array}{l|l} -1 \xrightarrow{g} 0 \xrightarrow{f} x \\ 1 \xrightarrow{g} 2 \xrightarrow{f} 3 & \Rightarrow (1, 3) \in fog \\ 2 \xrightarrow{g} 4 \xrightarrow{f} 5 & \Rightarrow (2, 5) \in fog \\ 5 \xrightarrow{g} 3 \xrightarrow{f} x \end{array} \Rightarrow fog = \{(1, 3), (2, 5)\}$$

(۱۶) اگر $f = \{(\cdot, 2), (1, -1), \left(3, \frac{-1}{4}\right), (-2, 3), (-1, \cdot)\}$ و $g = \left\{(\cdot, \sqrt{2}), (-1, 2), \left(\frac{1}{4}, 3\right), \left(1, \frac{3}{2}\right)\right\}$ باشند، تابع gof را بدست آورید.

(۹۴) خرداد

$$\begin{array}{l} \cdot \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{g} \sqrt{2} \Rightarrow (\cdot, \sqrt{2}) \in gof \\ 1 \xrightarrow{f} -1 \xrightarrow{g} 2 \Rightarrow (1, 2) \in gof \\ 2 \xrightarrow{f} \frac{-1}{4} \xrightarrow{g} x \\ -2 \xrightarrow{f} 3 \xrightarrow{g} x & \text{این باید نماین} \\ -1 \xrightarrow{f} \cdot \xrightarrow{g} x \end{array} \Rightarrow gof = \{(\cdot, \sqrt{2}), (1, 2)\}$$

(۹۱) خرداد


(۱۷) اگر $g = \{(\cdot, 4), (3, 2), (5, 6)\}$ و $f(x) = \sqrt{x-3}$ دو تابع باشند.

الف) تابع fog را به صورت زوج های مرتب بنویسید.

ب) دامنهٔ تابع $\frac{f}{g}$ را بنویسید.

$$\begin{cases} \cdot \xrightarrow{g} 4 \xrightarrow{f=\sqrt{x-3}} 1 \Rightarrow (\cdot, 1) \\ 3 \xrightarrow{g} 2 \xrightarrow{f=\sqrt{x-3}} \sqrt{2-3} \xrightarrow{\text{تعریف نشره}} \sqrt{-1} \\ 5 \xrightarrow{g} 6 \xrightarrow{f=\sqrt{x-3}} \sqrt{3} \Rightarrow (5, \sqrt{3}) \end{cases} \Rightarrow fog = \{(\cdot, 1), (5, \sqrt{3})\}$$


$$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x : g(x) = 0\} \Rightarrow D_{\frac{f}{g}} = \{3, 5\}$$



۱۸) اگر خروجی از ماشین شکل مقابل $\frac{4}{3}$ باشد، مقدار ورودی کدام است؟

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}} = \frac{4}{3} \Rightarrow x = 4 \Rightarrow 2x - 2 = 4 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$$

پاسخ:



۱۹) شکل مقابل نمودارهای توابع f, g است و $f \circ g(3) + g \circ f(1)$ کدام است؟

پاسخ:

$$f(g(1)) = f(6) = \frac{1}{3}(6) = 2$$

$$g(f(3)) = g(1) = 6$$

$$f \circ g(3) + g \circ f(1) = 6 + 2 = 8$$

نکته

تعداد زیادی از سوالات ترکیب دو تابع مربوط به تعیین دامنه ترکیب ضابطه و از راه تعریف است. دقت کن:

$$D_{f \circ g} = \left\{ x \in D_g : g(x) \in D_f \right\}$$

$$D_{g \circ f} = \left\{ x \in D_f : f(x) \in D_g \right\}$$

$$D_{f \circ f} = \left\{ x \in D_f : f(x) \in D_f \right\}$$



- ۱) ابتدا دامنه دو تابع را به دست آورید.
- ۲) فرمول دامنه ترکیب رو با توجه به یکی از سه مورد بالا بنویسید.
- ۳) با استفاده از فرمول و معمولیت های هر دامنه، دامنه ترکیب را حساب کنید.



(خرداد ۸۵)

۲۰) توابع $g(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = \sqrt{x-1}$ مفروض‌اند.

الف) بدون تشکیل ضابطه‌ی $f \circ g$ دامنه را تعیین کنید.

پاسخ:

$$D_{f \circ g} = \left\{ x \in D_g = \mathbb{R} - \{0\} \mid g(x) \in D_f = [1, +\infty) \right\} = \left\{ x \mid x \in \mathbb{R} - \{0\}, \frac{1}{x} \geq 1 \right\} = \left\{ x \mid x \in \mathbb{R} - \{0\}, x \leq 1 \right\} = (-\infty, 1] - \{0\}$$

ب) $g(f(\sqrt{x-1})) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

یعنی در تابع g بیای x ، ضابطه $f(x)$ رو قرار بده

اگر $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x}$ باشد دامنهٔ تابع gof کدام است؟

$$f(x) = x + |x| = \begin{cases} \sqrt{2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow x + |x| \geq 0 \Rightarrow D_f = \mathbb{R}, \quad D_g = \mathbb{R} - \{0, 4\}$$

پاسخ: \square

$\forall x \in (-\infty, 0] \Rightarrow \sqrt{x+|x|} = 0, \quad \sqrt{x+|x|} = 4 \Rightarrow \sqrt{2x} = 4 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$ می‌دانیم:

$$D_{gof} = \left\{ x : x \in \mathbb{R} \exists \sqrt{x+|x|} \neq 0, 4 \right\} = (0, +\infty) - \{8\}$$

در نتیجه: \square

(خرداد ۹۲) اگر $g(x) = \sqrt{x-3}$, $f(x) = \frac{1}{x-1}$ دو تابع باشند.

الف) مقدار $3(f-g)(4)$ را به دست آورید.

پاسخ: \square

$$(f-g)(4) = 3\left(\frac{1}{4-1} - \sqrt{4-3}\right) = -2$$

$$\text{ب) } D_f = \mathbb{R} - \{1\}, \quad D_g = [3, +\infty) \Rightarrow D_{fog} = \left\{ x : x \in D_g, g(x) \in D_f \right\} = \left\{ x : x \in [3, +\infty), \sqrt{x-3} \neq 1 \right\} = [3, +\infty) - \{4\}$$

(خرداد ۹۰) اگر $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = \frac{1}{x-3}$ باشد، آن‌گاه حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$D_{fog} \quad \text{الف) } (3f+2g)(4)$$

پاسخ: \square

$$3f = 3(3x-2) = 9x-6, \quad 2g = \frac{2}{x-3} \Rightarrow 3f+2g = (9x-6) + \left(\frac{2}{x-3}\right) \Rightarrow (3f+2g)(4) = 22$$


$$\text{ب) } D_{fog} = \left\{ x \in D_g = \mathbb{R} - \{3\} \mid \frac{1}{x-3} \in D_f = \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R} - \{3\}$$

(خرداد ۹۳ - خارج کشور) توابع $g(x) = 2x$, $f(x) = \sqrt{\frac{3x-2}{1-x}}$ مفروض‌اند. دامنهٔ تابع $fog(x)$ را محاسبه کنید.

$$\begin{array}{c|ccc} x & \frac{2}{3} & 1 & \\ \hline \frac{3x-2}{1-x} & - & + & - \end{array}, \quad D_f = \left[\frac{2}{3}, 1 \right), \quad D_g = \mathbb{R}$$

پاسخ: \square

$$D_{fog} = \left\{ x \in D_g \mid g(x) \in D_f \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 2x \in \left[\frac{2}{3}, 1 \right) \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{3} \leq 2x < 1 \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} \leq x < \frac{1}{2} \right\} = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$$



اگر f تابعی یک به یک باشد، معکوس‌بزیر و معکوس تابع f به صورت زیر است.

$$f^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$$

$$D_{f^{-1}} = R_f \quad D_f = R_{f^{-1}}$$

$$\forall x \in D_{f^{-1}} \quad f(f^{-1}(x)) = x \quad \forall x \in D_f \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

ترکیب هر تابع با تابع معکوس خود حتماً تابع همانی است. و اگر $b = f(a)$ آن‌گاه $a = f^{-1}(b)$



۱) نمودار توابع f, f^{-1} نسبت به خط $y = x$ متقارن‌اند.

۲) نمودار f, f^{-1} در صورت تقاطع عمومی‌گر را روی خط $y = x$ قطع می‌کنند. (نه همیشه)

۳) ممکن است نمودار f, f^{-1} بر هم منطبق باشند، مانند: $y = \frac{1}{x}$ و یا یکدیگر را قطع نکنند، مانند:

$$f^{-1}(x) = \log_2 x, \quad f(x) = 2^x$$



۱) ابتدا ثابت کنید تابع یک به یک است. (قسمت فسسه‌ی کار) این طوری:

$$\forall x_1, x_2 \in D_f : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

کمتر سوال میاد، بیشتر می‌خواهد ضابطه تابع معکوس رو مستقیم به دست بیارید

۲) تابع را بحسب x بنویسید یعنی از ضابطه داده شده x رو بحسب y تنها کنید. (قسمت سفت کار)

۳) در نهایت تابع حاصل را به صورت $(f^{-1})^{-1}(x) = y$ بنویسید.

۲۵) معکوس توابع زیر کدام است؟

۱) $y = ax + b$

۲) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$

پاسخ:

$$1) y = ax + b \Rightarrow ax = y - b \Rightarrow x = \frac{y - b}{a} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

$$2) f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x \Rightarrow y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - 1 = (x+1)^3 - 1 \Rightarrow y + 1 = (x+1)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{y+1} = x+1$$

$$x = \sqrt[3]{y+1} - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} - 1$$

مکعب کامل می‌کنیم

۲۶) در توابع زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید.

پاسخ:


$$f(x) = \frac{3x+1}{x-1} \Rightarrow f^{-1}(v) = ? \Rightarrow \frac{3x+1}{x-1} = v \Rightarrow vx - v = 3x + 1 \Rightarrow 4x = v - 1 \Rightarrow x = \frac{v-1}{4} \Rightarrow f^{-1}(v) = \frac{v-1}{4}$$

$$f(x) = x^3 - 2x, \quad x \leq 2 \Rightarrow f^{-1}(5) = ? \Rightarrow x^3 - 2x = 5 \Rightarrow x^3 - 2x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{24}}{2} = \begin{cases} 1 + \sqrt{6} \\ 1 - \sqrt{6} \end{cases} \quad \text{ق} \quad \text{ق}$$

(خرداد ۹۴)

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x-1 & x < 0 \end{cases}$$

پاسخ: مطابق شکل خطوط افقی $y = k \geq 0$ منحنی تابع را در بیش از یک نقطه قطع می‌کند. بنابراین تابع یک به یک نیست پس معکوس پذیر هم نخواهد شد.



(شهریور ۹۴)

$$28) \text{ تحقیق کنید آیا دو تابع } g(x) = \frac{1}{x-3} \text{ و } f(x) = \frac{1}{x+3} \text{ پذیرنده‌اند؟}$$

پاسخ: اول تابع $f(x)$ یک به یک است چون

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \rightarrow \frac{1}{x_1} + 3 = \frac{1}{x_2} + 3 \Rightarrow \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

حال معکوس آن را به دست می‌آوریم.

$$y = \frac{1}{x} + 3 \Rightarrow \frac{1}{x} = y - 3 \Rightarrow x = \frac{1}{y-3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{x-3} = g(x)$$

(شهریور ۹۴ خارج کشور)

$$29) \text{ پذیری تابع } y = \frac{2x+1}{x-1} \text{ را بررسی کنید و در صورت امکان ضابطه‌ی تابع وارون را به دست آورید.}$$

پاسخ:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{2x_1+1}{x_1-1} = \frac{2x_2+1}{x_2-1} \Rightarrow (2x_1+1)(x_2-1) = (2x_2+1)(x_1-1)$$

$$\Rightarrow 2x_1x_2 - 2x_1 + x_2 - 1 = 2x_2x_1 - 2x_2 + x_1 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$y = \frac{2x+1}{x-1} \Rightarrow yx - y = 2x + 1 \Rightarrow yx - 2x = y + 1 \Rightarrow x = \frac{y+1}{y-2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

$$30) \text{ نشان دهید تابع } f(x) = 1 + \sqrt[3]{x-5} \text{ وارون پذیر است، سپس وارون آن را بنویسید.}$$

پاسخ: اول باید نشان دهیم تابع وارون پذیر است، یعنی باید نشان دهیم تابع یک به یک است.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2: 1 + \sqrt[3]{x_1-5} = 1 + \sqrt[3]{x_2-5} \Rightarrow \sqrt[3]{x_1-5} = \sqrt[3]{x_2-5} \Rightarrow x_1-5 = x_2-5 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$y = 1 + \sqrt[3]{x-5} \Rightarrow y-1 = \sqrt[3]{x-5} \Rightarrow (y-1)^3 = (x-5) \Rightarrow x = (y-1)^3 + 5 \Rightarrow f^{-1}(x) = (x-1)^3 + 5$$

(خرداد ۹۱)

$$31) \text{ ثابت کنید تابع } f(x) = (x-2)^2, x \geq 2 \text{ وارون پذیر است، سپس ضابطه‌ی وارون آن را بنویسید.}$$

پاسخ:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1-2)^2 = (x_2-2)^2 \rightarrow |x_1-2| = |x_2-2| \xrightarrow{x \geq 2} x_1 = x_2$$

اثبات معکوس پذیری

$$y = (x-2)^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{(x-2)^2} \Rightarrow \sqrt{y} = |x-2| \xrightarrow{x \geq 2} \sqrt{y} = x-2 \Rightarrow x = \sqrt{y} + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 2$$

(شهریور ۹۲)

32) وارون پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وارون پذیری تابع، ضابطه‌ی وارون آن را به دست آورید.

$$f(x) = \sqrt{x+3} - 5$$

پاسخ:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \rightarrow \sqrt{x_1+3} - 5 = \sqrt{x_2+3} - 5 \Rightarrow x_1+3 = x_2+3 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$y = \sqrt{x+3} - 5 \Rightarrow y+5 = \sqrt{x+3} \Rightarrow (y+5)^2 = (x+3) \Rightarrow x = (y+5)^2 - 3 \Rightarrow f^{-1}(x) = (x+5)^2 - 3$$

(۳۳) اگر $f(a) = 3ax - 5$ و نقطه‌ی $(4, 3)$ روی نمودار تابع f^{-1} باشد، او لامقدار a را به دست آورید. ثانیاً ضابطه‌ی تابع وارون f را تعیین کنید.

پاسخ:

$$(4, 3) \in f^{-1} \Rightarrow (4, 3) \in f \Rightarrow f(3) = 3a(3) - 5 = 4 \Rightarrow 9a = 9 \Rightarrow a = 1$$

$$f(x) = 3x - 5 \Rightarrow y = 3x - 5 \Rightarrow y + 5 = 3x \Rightarrow x = \frac{y + 5}{3} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}$$



$$(fog)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \quad (1)$$

(۲) در توابع ای با ضابطه‌ی $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ (توابع هموگرافیک) اگر $a + d = 0$ باشد، آن‌گاه تابع و تابع معکوس با هم برابرند. $f(x) = f^{-1}(x)$ یعنی :

(۳۴) اگر $f(x) = 4x - 3$ و $g(x) = x + 2$ تابع $(gof)^{-1}$ را حساب کنید.

$$y = 4x - 3 \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{4}, \quad y = x + 2 \Rightarrow g^{-1}(x) = x - 2$$

$$(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} = f^{-1}(g^{-1}(x)) = \frac{x - 2 + 3}{4} = \frac{x + 1}{4}$$

(۳۵) اگر $x > 0$ آن‌گاه ضابطه‌ی $g^{-1} \circ f^{-1}$ کدام است؟

پاسخ:

$$y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow f^{-1}(x) = (x - 1)^{\frac{1}{r}}, \quad y = x^r \Rightarrow g^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

$$g^{-1} \circ f^{-1} = \sqrt{(x - 1)^r} = |x - 1|$$

(۳۶) تابع وارون $y = x^r$ ، تابع است.

دی ماه $y = f^{-1}(x) = \sqrt[r]{x}$

پاسخ:

(۳۷) در ماشین زیر ضابطه تابع g را تعیین کنید.




پاسخ:

$$g(x) = f^{-1}$$

$$f(x) = x^r + 1 \Rightarrow y = x^r + 1 \Rightarrow y - 1 = x^r \Rightarrow \sqrt[r]{y - 1} = x \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[r]{x - 1}$$

فصل ۲ مدلزنی




دوره تناوب

تابع با ضابطه $y = f(x)$ با دامنه D_f را در دامنه اش متناوب می‌گویند، هرگاه عدد حقیقی و ناصل T وجود داشته باشد به طوری که در دو شرط زیر صدق کند.

$$1) \forall x \in D_f \quad (x \pm T) \in D_f \quad , \quad 2) \forall x \in D_f \quad f(x \pm T) = f(x)$$

این یعنی اینکه شکل تابع در فاصله‌های T واحدی تکراریه مثل تابع سینوس که در فاصله‌های 2π واحدی تکرار می‌شود.



(۲۸) تابع $y = x - \lfloor x - 2 \rfloor$ مفروض است.

۳) نشان دهید تابع متناوب است.

۲) حدود y را بیابید.

۱) نمودار تابع رارسم کنید.


$$1) y = x - [x - 2] = x - [x] + 2$$

وقتی این تابع را ساده کنیم به فرم تابع فارفاسکی که دو واحد به سمت بالا در امتداد معمور y ها رفته می‌شود.

پاسخ:

$$2) 0 \leq x - [x] < 1 \Rightarrow 2 \leq x - [x] + 2 < 3 \Rightarrow 2 \leq y < 3$$

$$3) f(x) = x - [x] + 2 \Rightarrow T = \frac{1}{1} = 1$$



دوره تناوب اصلی تابع: اگر T دوره تناوب تابع f باشد آن گاه $\{0, nT, n \in \mathbb{Z}\}$ نیز دوره تناوب تابع است یعنی دوره تناوب تابع مجموعه‌ای بی‌شمار است، حال اگر این مجموعه دارای کوچک ترین عضو مثبت باشد آن را دوره اصلی تناوب اصلی می‌نامند.

دوره تناوب‌های مهم:

$$\begin{cases} f(x) = \sin^{n-1}(ax + b) \\ f(x) = \cos^{n-1}(ax + b) \end{cases} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{|a|}$$

$$\begin{cases} f(x) = \sin^n(ax + b) \\ f(x) = \cos^n(ax + b) \end{cases} \Rightarrow T = \frac{\pi}{|a|}$$

(۳۹) دوره تناوب کدام تابع بیشتر است؟

$y = \sin(2x + \frac{\pi}{4}) \quad (4)$

$y = \cos \frac{x}{2} \quad (3)$

$y = \cos \pi x \quad (2)$

$y = \sin 4x \quad (1)$

گزینه ۳ درست است زیرا

$\sin 4x \Rightarrow T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$\cos \pi x \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$

$\cos \frac{x}{2} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

$\sin(2x + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi$



(۱) هرگاه تابعی به صورت مجموع یا تفاضل چند تابع مثلثاتی ساده بود برای تعیین دوره تناوب اصلی تابع، ابتدا تناوب هر یک از توابع را حساب کرده سپس کوچک‌ترین مضرب مشترک آن‌ها را به دست می‌آوریم.

(۲) هرگاه تابع به صورت حاصل ضرب دو یا چند تابع مثلثاتی ساده باشد. ابتدا آن را به مجموع تبدیل کرده سپس دوره تناوب آن‌ها را تعیین می‌کنیم.

(۴۰) دوره تناوب تابع $y = \sin^2\left(\frac{3x}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{2x}{3}\right)$ را تعیین کنید.پاسخ:

$$y = \sin^2\left(\frac{3x}{4}\right) \Rightarrow T_1 = \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{4\pi}{3}, \quad y = \cos^2\left(\frac{2x}{3}\right) \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{\frac{2}{3}} = 3\pi \xrightarrow{\text{ممنوع}} T = 12\pi$$



اگر مجموع دو کمان برابر $\frac{\pi}{2}$ باشد آن‌گاه دو کمان متمم و اگر مجموع شان π باشد مکمل یکدیگرند.

$$a + b = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} \sin a = \cos b \\ \cos a = \sin b \\ \tan a = \cot b \\ \cot a = \tan b \end{cases} \quad a + b = \pi \Rightarrow \begin{cases} \sin a - \sin b = 0 \\ \cos a + \cos b = 0 \\ \tan a + \tan b = 0 \\ \cot a + \cot b = 0 \end{cases}$$

در صورت و پسورد

پندر مثال:

$\sin 18^\circ = \cos 72^\circ$

$\cot 54^\circ = \tan 36^\circ$

$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ$

نسبت های مثلثاتی زوایایی دو برابر کمان

$$1) \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$2) \begin{cases} \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) \\ \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \Rightarrow 1 + \cos 2\alpha \Rightarrow 2\cos^2 \alpha \Rightarrow 1 + \cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} \\ \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \Rightarrow 1 - \cos 2\alpha = 2\sin^2 \alpha \Rightarrow 1 - \cos \alpha = 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} \end{cases}$$

$$3) (\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm 2\sin \alpha \cos \alpha = 1 \pm \sin 2\alpha$$

(۴۴) شهریور

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

نیشان دهید برای هر زاویه α داریم:پاسخ:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1 \Rightarrow \cos 2\alpha + 1 = 2\cos^2 \alpha \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

(خرداد ۹۴ - خارج کشور)

در صورتی که $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ و زاویه α حاده باشد مقدار عددی $\cos 2\alpha$ را محاسبه کنید.پاسخ:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \Rightarrow \cos 2\alpha = 1 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{7}{25}$$

خلاصه شده عبارت $(1 + \cos 40^\circ) \tan 20^\circ$ را به دست آورید.پاسخ:

$$\tan 20^\circ (1 + \cos 40^\circ) = \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} (2\cos^2 20^\circ) = 2\sin 20^\circ \cos 20^\circ = \sin 40^\circ = \cos 50^\circ$$

خلاصه شده عبارت $\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right)\sin(\pi + a) - \sin(\pi - a)\cos a$ را بنویسید.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right)\sin(\pi + a) - \sin(\pi - a)\cos a = \cos a(-\sin a) - \sin a \cos a = -2\sin a \cos a = -\sin 2a$$

پاسخ:

(دی ماه ۹۲)

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

نشان دهید برای هر زاویه α داریم:پاسخ:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

(خرداد ۹۱)

سینوس زاویه $22/5^\circ$ را حساب کنید.پاسخ: زاویه $22/5^\circ$ در نسبت های مثلثاتی رایج نیست ولی به کمک زاویه 45° می توانیم اونا را به دست بیاریم

$$1 - \cos 2x = 2\sin^2 x \rightarrow \sin x = \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} \Rightarrow \sin 22/5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}$$

با توجه به این که $\sin 75^\circ$ حاصل $\sin 22/5^\circ$ را بیابید.پاسخ: فرمیلیون فروده سفته وی

$$\cos 15^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \Rightarrow \sin^2 75^\circ / 5^\circ = \frac{1 - \cos 15^\circ}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{2} \Rightarrow \sin 75^\circ / 5^\circ = \sqrt{\frac{4 - \sqrt{6} - \sqrt{2}}{8}}$$

رسم نمودار های مثلثاتی



۱) در تابع: $f(x) = a \cos bx + c$ و $f(x) = a \sin bx + c$ مقدار ماکزیمم تابع $|a| + c$ و مقدار مینیمم آن $-|a| + c$

$$|a| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}, \quad c = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}$$

و دوره تناوب $\frac{2\pi}{|b|}$ خواهد بود. و یادت باشه:

۲) یعنی با داشتن ضابطه‌ی توابع فوق ماکسیمم و مینیمم و دوره تناوب تابع تعیین می‌شود و با داشتن مقادیر ماکسیمم و مینیمم و دوره تناوب می‌توان ضابطه‌ی تابع را تعیین کرد.

یادت باشه:

۱) در تابع $y = a \sin x$ خواهیم داشت. $y_{\min} = -|a|$ ، $y_{\max} = |a|$ است اگر $a > 0$ باشد و اگر $a < 0$ تابع نزولی عبور می‌کند.

$$y_{\min} = -|a|, \quad y_{\max} = |a| \quad T = \frac{2\pi}{|b|}$$

اما تابع $y = a \sin bx$ دارای دوره تناوب $T = \frac{2\pi}{|b|}$ است و

۳) در تابع $y = \sin bx + c$ همان نمودار $y = \sin bx$ به سمت چپ یا راست انتقال دارد.

۴۸) ضابطه تابع به فرم $y = a \sin bx + c$ را بنویسید که دوره تناوب آن π ، مقدار ماکزیمم آن ۴ و مقدار مینیمم آن -۲ باشد.

$$T = \pi = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow |b| = 2 \quad |a| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} = \frac{4 - (-2)}{2} = 3 \quad c = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1$$


$$y = 3 \sin 2x + 1$$

۴۹) ولتاژ یک دستگاه لوازم خانگی بر حسب کسینوس نسبت به زمان دارای فرکانس یا دوره تناوب $\frac{1}{8^\circ}$ است و تغییرات ولتاژ در بازه $[12^\circ, 12^\circ]$ است معادله ولتاژ این دستگاه را بنویسید.


$$v(t) = a \cos(bt) + c$$

$$\frac{2\pi}{b} = \frac{1}{8^\circ} \Rightarrow b = 16^\circ \pi, \quad a = \frac{12^\circ - (-12^\circ)}{2} = 12^\circ, \quad c = \frac{12^\circ - 12^\circ}{2} = 0^\circ \Rightarrow v(t) = 12^\circ \cos 16^\circ \pi t$$

نمودار تابع $y = -2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$ را رسم کنید.



۵۱) شکل مقابل نمودار $y = a \cos bx$ است. مقادیر a, b را تعیین کنید و مقدار تابع در $x = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$ به دست آورید.




$$b = 4 \quad T = \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{|b|} \quad \text{است در نتیجه}$$

و تغییرات تابع در بازه $[-6, 6]$ است و پون رو زند تابع در مبدأ نزولی است پس $a = 6$ است و معادله منتهی به صورت $y = 6 \cos 4x$ فواهد بود.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{12}\right) = 6 \cos\left(4 \times \frac{\sqrt{3}\pi}{12}\right) = 6 \cos \frac{\sqrt{3}\pi}{3} = 6 \cos \frac{\pi}{3} = 6 \left(\frac{1}{2}\right) = 3$$

در نتیجه :

۵۲) نمودار تابع $y = a \cos b\pi x + 3$ مطابق شکل روبروست است. حاصل $a+b$ کدام است؟



$$f(0) = a \cos b\pi(0) + 3 = a + 3 = 5 \Rightarrow a = 2 \quad \text{پاسخ: در نقطه ۰}$$

طبق نمودار فاصله‌ی $x=2$ تا $x=0$ برابر نصف دوره‌ی تابع مورد نظر است:

$$2-0=\frac{T}{2} \Rightarrow T=4 \Rightarrow \frac{2\pi}{|b\pi|}=4 \Rightarrow b=\pm\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} a+b=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2} \\ a+b=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2} \end{cases}$$

منظور از هل معادله‌ی مثلثاتی یاختن تمام کمان‌هایی است که در معادله صدق می‌کنند، هر معادله‌ی مثلثاتی در صورت داشتن جواب به یکی از معادلات زیر تبدیل می‌شود، به هل و بسط هر یک می‌پردازیم.

$$1) \sin x = m = \sin \theta$$

$$2) \cos x = m = \cos \theta$$

معادلات سینوسی

(۱)


$$\sin x = m = \sin \theta$$

$$(-1 \leq m \leq 1)$$

$$x = \begin{cases} 2k\pi + \theta \\ 2k\pi + \pi - \theta \end{cases}$$


جواب‌های عمومی

$$k \in \mathbb{Z}$$




حالات‌های قائم ↙

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$$




$$\sin x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

ریشه‌های متفاوت



$$\sin x = -1 \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$$

ریشه‌های متفاوت

۵۳) معادله‌ی $\sin 2x = \sin x$ را حل کنید.پاسخ:

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + x & \Rightarrow x = 2k\pi \\ 2x = 2k\pi + \pi - x & \Rightarrow 3x = (2k+1)\pi \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{3} \end{cases}$$

(۴۳) ماه

۵۴) معادله $2\sin^2 x - \sin x = 0$ را حل کرده جواب‌هایی که در بازه $[0, 2\pi]$ هستند را تعیین کنید.پاسخ:

$$\sin x(2\sin x - 1) = 0$$


$$\begin{cases} \sin x = 0 & \Rightarrow x = k\pi \\ 2\sin x - 1 = 0 & \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases} \end{cases}$$

$$\cos x = m = \cos \theta$$

$$-1 \leq m \leq 1$$

$$x = \begin{cases} 2k\pi - \theta \\ 2k\pi + \theta \end{cases}$$

پوایه‌های عمومی




حالات‌های قائم ↘

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}$$



$$\cos x = -1 \Rightarrow x = 2k\pi$$

(۵۵) معادله $\cos 3x - \cos x = 0$ را حل کنید.

$$\cos 3x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos 3x = \cos x \Rightarrow 3x = 2k\pi \pm x \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{k\pi}{2} \end{cases}$$

(۵۶) معادله $\cos 2x - 3\cos x + 2 = 0$ را حل کنید.

پاسخ: ☐

۱ + cos 2x - 3 cos x + ۱ = ۰ $\Rightarrow ۲\cos^2 x - ۳\cos x + ۱ = ۰ \Rightarrow \cos x = \frac{۳ \pm \sqrt{۹ - ۸}}{۴} = \begin{cases} \cos x = ۱ \\ \cos x = \frac{۱}{۲} \end{cases}$

$$\cos x = 1 = \cos 2k\pi \Rightarrow x = 2k\pi , \quad \cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

(۴۳) شهریور

(۵۷) معادله $\sin 2x - \sqrt{3} \cos x = 0$ را حل کنید.

پاسخ: ☐

$$\sin x \cos x - \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (\sin x - \sqrt{3}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = ۰ \\ \sin x - \sqrt{3} = ۰ \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = ۰ \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi + \frac{\pi}{2} \\ x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

(۴۴) شهریور

(۵۸) معادله $\sin^2 x = \cos^2 x + ۱$ را حل کنید.

پاسخ: ☐

$$1 - \cos^2 x = \cos^2 x + 1 \Rightarrow 2\cos^2 x = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

بخش پذیری

فرض کنید $p(x) = g(x)q(x) + r(x)$ دو چند جمله ای با شدن در این صورت چند جمله ای های منحصر به فرد $r(x)$, $q(x)$ و $p(x)$ وجود دارند به طوری که $r(x)$, $q(x)$ را باقیمانده می نامند.

اگر $p(x)$ از درجه n و مقسوم علیه $g(x)$ باشد آنگاه فارج قسمت $q(x)$ از درجه m حداقل از درجه i است.

مثال

$$\begin{array}{r} p(x) \quad \text{مقسوم: درجه ۳} \\ \hline x^3 - 2x + 1 & | \quad x - 1 \\ -(x^3 - x^2) & \quad x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 - 2x + 1 & \quad \boxed{\text{فارج قسمت: درجه ۲}} \\ -(x^2 - x^2) & \\ \hline x^2 - 2x + 1 & \\ -(x^2 - x) & \\ \hline -x + 1 & \\ \hline -(-x + 1) & \\ \hline 0 & \quad \boxed{r(x) \text{ باقیمانده صفر شده یعنی بخش پذیر است}} \end{array}$$



۱) اگر $p(x)$ یک چند جمله ای آنگاه باقیمانده تقسیم $g(x) = x - a$ برابراست با:

۲) برای پیدا کردن باقیمانده تقسیم $p(x)$ بر $ax + b$ ابتدا مقسوم علیه را مساوی صفر قرار می دهیم و ریشه آن را بدست آورده و در مقسوم به جای x قرار می دهیم آنگاه داریم: $r = p\left(\frac{-b}{a}\right)$ بدینهای است که اگر $r = 0$ باشد، $p(x)$ بر $(ax + b)$ بخش پذیر است


۵۹) مقدار k را چنان بیابید که چند جمله ای $p(x) = 2x^3 - kx^2 - x + 3$ بخش پذیر باشد.

$$x+1=0 \Rightarrow x=-1 \Rightarrow p(-1)=0 \Rightarrow 2(-1)^3 - k(-1)^2 - (-1) + 3 = 0 \Rightarrow k=2 \quad (\text{ک})$$

۶۰) مقدار k را طوری تعیین کنید که عبارت $2x - 1 - 8x^3 + 4x^2 - kx - 8$ بر $1 - 2x$ بخش پذیر باشد؟

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow p\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 8\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 - k\left(\frac{1}{2}\right) - 8 = 0 \Rightarrow k = -12 \quad (\text{ک})$$

فرض کنید تابع $f(x)$ در یک همسایگی متقاضی مذکور ن نقطه‌ی $x=a$ تعریف شده باشد، آن‌گاه می‌گوئیم تابع $f(x)$ در نقطه‌ی $x=a$ محدود و مقدار آن L است هر وقت با میل کردن X به سمت عدد معین L میل کند. در واقع می‌عنی رفتار تابع در مجاورت نقطه‌ی a و اصلاربیطی به مقدار تابع در نقطه‌ی a ندارد.



- حد راست: اگر x از طرف راست به سمت a میل کند و تابع $f(x)$ به عددی مانند L نزدیک شود، می‌گوئیم تابع $f(x)$ در نقطه‌ی a محدود و به صورت رو به رو نشان می‌دهیم:


$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$$

- حد چپ: اگر x از طرف چپ به سمت a میل کند و تابع $f(x)$ به عددی مانند L نزدیک شود، می‌گوئیم تابع $f(x)$ در نقطه‌ی a محدود و به صورت رو به رو نشان می‌دهیم:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$$

بررسی حد تابع از روی نمودار:

برای تعیین حد تابع از روی نمودار به شکل زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا پندر نقطه روی مفور X ‌ها در سمت راست نقطه a انتقاب می‌کنیم از این نقاط از راست به چپ فظوظی عمود بر مفور X ‌ها فارج می‌کنیم و مهل تقاطع آن‌ها را با نمودار تابع به دست آورده و از نقاط تقاطع به مفور Y ‌ها عمود می‌کنیم. با این‌کار رفتار Y ‌تابع هنگامی که X ‌ها به a از سمت راست نزدیک می‌شوند را مشاهده می‌کنیم. همین‌کار را از سمت چپ نقطه a انجام می‌دهیم اگر شافه‌هایی سمت چپ و راست نمودار f در $x=a$ به عرض L روی مفور Y ‌ها برستند آن‌گاه تابع در نقطه a محدود است.




$$(61) \text{ نمودار تابع } f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x & x \geq 1 \\ 4 - x^2 & x < 1 \end{cases} \text{ بروزی کنید.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} -\frac{1}{2}x = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 4 - x^2 = 4 - 1 = 3$$

تابع در این نقطه محدود نیست.




(62) نمودار $f(x)$ شکل مقابل است. حاصل عبارت $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + 2f(3)$ را به دست آورید.

پاسخ:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 \quad f(3) = 4$$

$$2 \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + 2f(3) = 2(3) - (3) + 2(4) = 14$$



(63) با توجه به نمودار تابع f حاصل حددهای زیر را به دست آورید.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -2$$

پاسخ:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} [f(x)] = [-1^-] = -2$$



صفر مطلق

اساساً صفر مطلق یعنی تابع ای در تمامی یک بازه همواره صفر باشد یعنی به ازای \mathbf{x} های یک بازه $0 = f(x)$ می‌شود. مثلاً صفری که به وسیله برآخت ساخته شور صفر مطلق است.

$$\begin{cases} 0^- \cong 0 \leq x < 1 \Rightarrow [0^-] = 0 \\ 0^+ \cong 0 \leq x < 1 \Rightarrow [0^+] = 0 \end{cases}$$

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow [\sin x] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\sin x] = [\sin 0^+] = [0^+] = 0$$



تو یه بازه این تابع صفره، بنابراین صفرش مطلقه.

حدود توابع کسری

برای محاسبه حد توابع کسری به نکات زیر توجه دارید:

اگر صورت و مخرج کسر صفر نشده که قیلی راهته، مقدار گذاری می‌کنیم. فلاصن

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

اما آنکه فقط مخرج صفر هدی بشه و صورت عدد ناصفر، پوچ این بی نهایت میشه.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L \neq 0}{0}$$

صفر هدی

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\text{صفر مطلق}}{\text{صفر هدی}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\text{صفر هدی}}{\text{صفر مطلق}} = \text{وجود ندارد}$$

اگر صورت و مخرج هر دو صفر بشن هالست های زیر رخ میدهه:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

صفر مطلق

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

صفر هدی

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\text{صفر هدی}}{\text{صفر هدی}} = \text{ابهام}$$

اگر هر ابهام $\frac{0}{0}$ داشت، باید آن را رفع ابهام کنیم که روش های رفع ابهام را فواهیم گفت.

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}}{2 - \sqrt{x}} = \frac{4}{2 - \sqrt{1}} = \frac{2}{1} = 2$$

پاسخ:

$$64) \text{ حاصل حدود } 2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^r + 1}{x^r - 4x + 4} \text{ و } 1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}}{2 - \sqrt{x}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r + 1}{x^r - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r + 1}{(x - 2)^r} = \frac{5}{(0^\pm)^r} = \frac{5}{0^+} = +\infty$$

هر چند هر چپ و راست هر دو برابر $+\infty$ شده اند ولی به قاطر آن که عدد نیستند، تابع در این نقطه هر ندارد.

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{[x]-1}$$

65) حاصل حدود رو به رو را محاسبه کنید:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} = \frac{\text{مطلق}}{\text{هدی}} = 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{[x]-1} = \frac{x-1}{[1^+]-1} = \frac{\text{هدی}}{\text{مطلق}} = \text{وجود ندارد}$$

پاسخ:

سوالات ابهام‌دار



مسئله

- ۱) در ابتدای کار، ابهام $\frac{0}{0}$ را بیان کنید و بنویسید.
- ۲) عامل ابهام در $x = a$ ، $x - a = 0$ می‌باشد. که باید آن را از صورت و مخرج فاکتور بگیریم و ساده کنیم. (به این کار می‌گن رفع ابهام)
- ۳) پس از ساده کردن، مقدار $x = a$ را جایگذاری کنید و هر را به دست آورید.
- ۴) در هر مرحله \lim یادت نرہ.

هرگاه بشه اصطلاحامی گویند حد ابهام صفر صفرم داره، معنیش این که عامل $(x - a)$ یعنی عامل صفر کننده هم در صورت و هم در مخرج وجود داره و باعث ابهام $\frac{0}{0}$ می‌شه. برای رفع ابهام یکی از روش‌های زیر را استفاده می‌کنیم.

از عامل $(x - a)$ هم در صورت و هم در مخرج فاکتور می‌گیریم و پس از ساده نمودن مقدارگذاری می‌کنیم. (در توابع چند جمله‌ای خطی بیشتر کاربرد داره)

۶۶) حدود زیر را محاسبه کنید.

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^r + x - 6}{x - 2}$$

$$2) \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t+1}{t^r + 1}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - x}{x^r + x - 2}$$

پاسخ:

وقتی $x \rightarrow 2$ عامل صفر $(x - 2)$ می‌شه. در صورت و مخرج از اون فاکتور گرفتیم.

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^r + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5$$

$$2) \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t+1}{t^r + 1} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{(t+1)}{(t+1)(t^r - t+1)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{1}{t^r - t + 1} = \frac{1}{3}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - x}{x^r + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{1}{3}$$

(خرداد و شهریور ۹۰)

۶۷) حد توابع زیر را محاسبه کنید.


$$1) \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r - 8}{3x^r - 12}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow r} \left(\frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^r - 9} \right)$$

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r - 8}{3x^r - 12} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{(x-r)(x^r + 2x + 4)}{3(x-r)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r + 2x + 4}{3(x+2)} = \frac{12}{12} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow r} \left(\frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^r - 9} \right) = \lim_{x \rightarrow r} \left(\frac{2}{x-3} - \frac{12}{(x-3)(x+3)} \right) = \lim_{x \rightarrow r} \frac{2x-6}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{2\cancel{(x-3)}}{\cancel{(x-3)}(x+3)} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{2}{x+3} = \frac{1}{3}$$



نکته: اگر تجزیه صورت و مخرج برای یافتن عامل ابیا م مشکل باشد می توانیم با تقسیم هر کدام بر $(x-a)$ آن را تجزیه کنیم.

۶۸) حدود توابع زیر را تعیین کنید.

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 2x - 1}{x^r - 1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r - x^r - x - r}{x^r - 2x^r - x^r + 2x}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 2x + 1}{2x^r - 3x + 1}$$

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 2x - 1}{x^r - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x^r - x - 1)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - x - 1}{x - 1} = \frac{1}{-2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow r} \frac{x^r - x^r - x - r}{x^r - 2x^r - x^r + 2x} = \lim_{x \rightarrow r} \frac{(x-r)(x^r + x + 1)}{(x-r)(x^r - x)} = \frac{r+r+1}{r-r} = \frac{7}{6}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 2x + 1}{2x^r - 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^r + x^r + x - 1)}{(x-1)(2x-1)} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\begin{array}{r} x^r - 2x + 1 \\ \underline{-(x^r - x^r)} \quad | \quad x-1 \\ x^r - 2x + 1 \\ -(x^r - x^r) \\ \hline x^r - 2x + 1 \\ -(x^r - x) \\ \hline -x + 1 \\ -(-x + 1) \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x^r - 3x + 1 \\ \underline{-(2x^r - 2x)} \quad | \quad x-1 \\ -x + 1 \\ -(-x + 1) \\ \hline \end{array}$$

۲) هرگاه صورت یا مخرج عامل ابیا رادیکالی داشته باشد (مثلا: $(\sqrt{x} - \sqrt{a})$) صورت و مخرج را در مزدوج عامل رادیکالی ضرب می کنیم پس از گویا و ساده کردن رفع ابیا نموده، در رابطه دست می آوریم.



$$(x-a)(x+a) = x^r - a^r$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a}) = x - a$$

$$(x \pm a)(x^r \mp ax + a^r) = x^r \pm a^r$$

$$(\sqrt[r]{x} \pm \sqrt[r]{a})(\sqrt[r]{x^r} \mp \sqrt[r]{x}\sqrt[r]{a} + \sqrt[r]{a^r}) = x \pm a$$

مزدوج های مهم:

(خرداد ۹۳)

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 16}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{2x - 2}$$

حد زیر را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 16} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 16} \times \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)}{(x - 4)(x + 2)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(x + 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{32}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{2x - 2} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{2(x - 1)} \times \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)}{2(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{4}$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2}{\sqrt{2x} - 2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 64}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{3x+7} - 4}{9 - x^2}$$

حدود روبه رو را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2}{\sqrt{2x} - 2} \times \frac{\sqrt{2x} + 2}{\sqrt{2x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 2)(\sqrt{2x} + 2)}{2x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 2)(\sqrt{2x} + 2)}{2(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x} + 2}{2} = 4$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 64}{\sqrt[3]{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(x - 8)(x + 8)}{(\sqrt[3]{x} - 2)} \times \frac{\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x} + 4} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(x - 8)(x + 8)(\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{(x - 8)} = 192$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{3x+7} - 4}{9 - x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{3x+7} - 4}{(3-x)(3+x)} \times \frac{\sqrt{3x+7} + 4}{\sqrt{3x+7} + 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x - 9}{(3-x)(3+x)(4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3(x-3)}{-((x-3)(x+3)(4))} = \frac{-1}{16}$$

(خرداد و شهریور ۹۴ - خارج کشور)

حدود توابع زیر را محاسبه کنید.

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2} \times \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 2)} = \sqrt{4} + 2 = 4$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} \times \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} + 1 = 2$$

حد تابع زیر را تعیین کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \sqrt{x}}$$


پاسخ:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \sqrt{x}} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{1 - \sqrt{x}} \times \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)(1 + \sqrt{x})}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-1)(2)(2)}{-1} = -4$$

حدود توابع مثلثاتی در نقاط مرزی



در محاسبه حد های یک طرفه در توابع مثلثاتی دو نستن این که زاویه در کدوم ناحیه مثلثاتی خیلی مهم است. مثلا وقتی $\rightarrow -\infty$ یعنی x در ربع چهارم و به صفر نزدیک می شود، یا وقتی $\rightarrow +\infty$ یعنی x در ربع اوله و به صفر نزدیک می شود. این مطالب را در شکل زیر بررسی می کنیم.



$$\tan \frac{\pi^-}{2} = +\infty \quad \text{ناحیه اول}$$

$$\tan \frac{3\pi^-}{2} = +\infty \quad \text{ناحیه سوم}$$

$$\tan \frac{\pi^+}{2} = -\infty \quad \text{ناحیه دوم}$$

$$\tan \frac{3\pi^+}{2} = -\infty \quad \text{ناحیه چهارم}$$

$$\tan \frac{\pi}{2} \quad \text{تعريف نشده}$$

$$\tan \frac{3\pi}{2} \quad \text{تعريف نشده}$$

۷۳) حاصل حدود زیر را بیابید.

$$1) \lim_{x \rightarrow \frac{\Delta\pi^+}{2}} \tan x \quad 2) \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi^+}{2}} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{3})}{\sin(x + \frac{\pi}{3})}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^+}{2}} \frac{1}{\cos x}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin x}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x}$$

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow \frac{\Delta\pi^+}{2}} \tan x = \lim_{x \rightarrow \frac{\Delta\pi^+}{2}} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{0^+} = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi^+}{2}} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{3})}{\sin(x + \frac{\pi}{3})} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^+}{2}} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{0^+} = -\infty$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin \pi^+} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x} = \frac{1 + 0}{1 - 0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$



در هالت ابعام $\frac{0}{0}$ اگر عامل ابعام در صورت یا مخرج دافل قدر، مطلق باشد، باید تکلیف قدر، مطلق را با تعیین علامت مشخص کنیم و هر چهار راست را جداگانه بررسی کنیم.

(۷۴) حدود زیر را محاسبه کنید.

۱) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x - 3|}{x - 3}$

۲) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^r - 3}{|3 - x|}$

۳) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^r - 1|}{x - 1}$

پاسخ:

۱) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-(3-x)(3+x)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x+3) = 6$

۲) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^r - 3}{|3 - x|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^r - 3}{3 - x} = \frac{r}{+} = +\infty$

۳) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^r - 1|}{x - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)(x+1)}{x-1} = -2 \end{cases}$

(۷۵) حاصل حدود زیر را به دست آورید.

۱) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x - 3| + |x^r - 3|}{|x - 3|}$

۲) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^r - 3}{|x^r - 3x + 6|}$

پاسخ:

۱) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x - 3| + |x^r - 3|}{|x - 3|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x - 3| + |x - 3||x + 3|}{|x - 3|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x - 3|(1 + |x + 3|)}{|x - 3|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} (1 + |x + 3|) = 1 + |3 + 3| = 7$

۲) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^r - 3}{|x^r - 3x + 6|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3)(x+3)}{|(x-3)(x-3)|} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-3)} = \frac{3}{-1} = -3$



برای محاسبهٔ حدودی که شامل عبارت برآلتی است، اول تکلیف قسمت برآلتی را تعیین می‌کنیم و به جای آن عدد صحیح مناسب را قرار می‌دهیم، سپس به ادامه هر می‌پردازیم.

(۷۶) حدود توابع زیر را محاسبه کنید.

۱) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[x] - 3}{x - 3}$

۲) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^r - [x^r]}{x - [x]}$

پاسخ:

۱) $x \rightarrow 3^+ \Rightarrow 3 \leq x < 4 \Rightarrow [x] = 3 \Rightarrow [3^+] = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[x] - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[3^+] - 3}{x - 3} = \frac{\text{مطلق}}{\text{مردی}} = +$

$$\left[(1^+)^r \right] = 1$$


۲) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^r - [x^r]}{x - [x]} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^r - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x^r + x + 1)}{(x-1)} = 3$

$$\left[(1^+)^r \right] = 1$$


حدود نامتناهی :

اگر تابع f در همسایگی محدود نقطه $x=a$ تعریف شده باشد و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ شود، معنایش این است که مقادیر y تابع یعنی عرض آن از هر عدد مثبت بسیار بزرگی، بزرگتر است به شرط آن که $x=a$ به اندازه کافی به a نزدیک شود (در مجاورت $x=a$ عرض تابع بیکران یا همان بی نهایت می شود)

$$\begin{cases} x \rightarrow a & \text{عدد} \\ y \rightarrow +\infty & \end{cases}$$




$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4x + 4} \quad \text{حاصل را به دست آورید.} \quad (77)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{(x-2)^2} = \frac{\Delta}{(\circ^\pm)^2} = \frac{\Delta}{\circ^+} = +\infty$$

هر پندر، هر پهپ و راست هر دو برابر $+\infty$ شده اند ولی به قاطر آن که عدد نیستند، تابع در این نقطه هر ندارد.

اگر تابع f در همسایگی محدود نقطه $x=a$ تعریف شده باشد و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ شود، معنایش این است که مقادیر y تابع یعنی عرض آن از هر عدد منفی کوچکتر است به شرط آن که $x=a$ به اندازه کافی به a نزدیک شود.

$$\begin{cases} x \rightarrow a & \text{عدد} \\ y \rightarrow -\infty & \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-4}{x^2 + 6x + 9} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-4}{(x+3)^2} = \frac{-7}{(\circ^\pm)^2} = \frac{-7}{\circ^+} = -\infty$$

مثال

بعضی وقت ها حاصل حد در یک نقطه ۲ تا بی نهایت با علامت های متفاوت میشه

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{x-2} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+1}{x-2} = \frac{\Delta}{\circ^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x+1}{x-2} = \frac{\Delta}{\circ^-} = -\infty \end{cases}$$



مثال

در توابع کسری ریشه هایی از مخرج کسر، به شرط آن که در این نقاط بتوان حد گرفت و حد ∞ شود. (یعنی باید در همسایگی چپ یا راست ریشه مخرج تابع تعریف شده باشد) حدود بی نهایتی ایجاد می کنند.

(78) حاصل حدود زیر را محاسبه کنید:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x]}{x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{[x] - 3}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

پاسخ:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2}{x} = \frac{2}{\circ^+} = +\infty$$

$$۱) D_f = R - \{x | [x] - 3 = 0\} = R - \{3, 3\}$$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ این محدود ندارد، پون در همسایگی راست این نقطه تابع تعریف نشده

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{[x] - 3} = \frac{1}{2 - 3} = -1$$



می‌باشد:

$$۲) \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{2}{0^+}} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{2}{0^-}} = \end{cases}$$

با توجه به دامنه اساساً این محدود ندارد
پون در سمت پل نقطه $x = -1$ تابع
تعریف نشده.

x	-1	1
$\frac{1-x}{1+x}$	-	+

۷۹) حدود زیر را محاسبه کنید.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|} + \frac{x^r + 1}{\sin^r x} = \frac{1}{|\circ^\pm|} + \frac{(\circ^\pm)^r + 1}{(\circ^\pm)^r} = \frac{1}{\circ^+} + \frac{1}{\circ^+} = (+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \circ^+} \frac{1}{x^r - 3x} = \lim_{x \rightarrow \circ^+} \frac{1}{x(x-3)} = \frac{1}{\circ^+ (\circ^+ - 3)} = \frac{1}{\circ^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{r}} \frac{[x] - 3}{|rx - 1|} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{r}} \frac{\circ - 3}{|\circ^\pm|} = \frac{-3}{\circ^+} = -\infty$$

حد در بینهایت: اگه متغیر ما بره به سمت بینهایت یعنی $\rightarrow \infty$ و عرض تابع یعنی y آن به یک عدد نزدیک شود می‌گوییم تابع ما در

بینهایت حد دارد و می‌نویسیم: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

$$\left| \begin{array}{l} x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \text{عدد بشه} \end{array} \right.$$

به عبارت دیگر



در کتاب درسی تأکید به محاسبه محدود در بینهایت توابع کسری که صورت و مخرج آنها پندر بمله می‌باشد داره. برای محاسبه محدود توابع کسری وقتی $\rightarrow \infty$ میل می‌کند در صورت و مخرج از بزرگترین توان x فاکتور بگیر، ساده کن و حاصل محدود رو پیدا کن.

یادت باش: در توابع کسری وقتی $\pm\infty \rightarrow x$ میل می کند و صورت و مخرج کسر ∞ می شود و ابهام $\frac{\infty}{\infty}$ رخ می دهد می توان از قاعده پرتوان استفاده کرد یعنی در صورت و مخرج جمله ای که بزرگترین توان از x را دارد در نظر می گیریم و حد عبارت حاصل را محاسبه می کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^n + bx^{n-1} + \dots}{a'x^m + b'x^{m-1} + \dots} = \xrightarrow{\text{قاعده پرتوان}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^n}{a'x^m} = \begin{cases} \frac{a}{a'} & n = m \\ \infty & n < m \\ \infty & n > m \end{cases}$$

یعنی

۱) وقتی جواب حد عدد ناصرف بشه معنیش اینکه توان صورت و مخرج برابره

۲) اگه جواب حد صفر بشه توان مخرج بیشتر از توان صورته.

۳) اگه بی نهایت شد یعنی توان و مرتبه ای صورت بزرگتر از توان و مرتبه ای مخرجه.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^r + 7x - 9}{2x^r - 4x^r + x} \text{ چند برابر } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 + \frac{7}{x^r} \right) \text{ حاصل (۸۰) است؟}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 + \frac{7}{x^r} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 9 + \frac{7}{(-\infty)^r} = 9 + 0 = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^r + 7x - 9}{2x^r - 4x^r + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^r}{2x^r} = \frac{-6}{2} = -3$$

هر دو تابع، هنگامی که x شان بینهایت می شود، عرضن شان عدد شده، پس هر دو در بینهایت هر دارند و اولی -3 برابر دومی است.

۸۱) حدود زیر را محاسبه کنید

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x} + x}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^r - 2x + 4}{x^r + 3x - 2x^r} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^r}{-2x^r} = \frac{-1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^r + 3x - 5}{x^r - x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^r}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^r + 2x + 3} - x}{3x - 1} \text{ حاصل حد را به دست آورید. (۸۲)}$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^r + 2x + 3} - x}{3x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^r \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^r} \right)} - x}{3x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^r}} - x}{3x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^r}} + 1 \right)}{3x} = \frac{-2x}{3x} = \frac{-2}{3}$$

را برکال میره به سمت ا

۸۳) حاصل حد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Delta x^r + \sqrt{x^r + x}}{2x^r - 3x - 1}$ را حساب کنید.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Delta x^r + \sqrt{x^r + x}}{2x^r - 3x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Delta x^r}{2x^r} = \frac{\Delta}{2}$$

۸۴) حاصل تمامی حدود زیر را محاسبه کنید.



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)] + \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = [2^+] + [1^-] = 2 + 0 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \end{cases}$$

۸۵) حد کدام تابع شبیه شکل مقابل است؟



$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x}{x-1} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^r} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[1-x]} \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1-x} \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1-x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{1-x} = \frac{-1}{0^-} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1}{1-x} = \frac{-1}{0^+} = -\infty \end{cases}$$



مشتق تابع در یک نقطه: فرض کنید تابع $f(x)$ در یک همسایگی نقطه‌ی a تعریف شده باشد. اگر هر محدود باشد، یعنی عدد شود اصطلاحاً گوییم تابع $f(x)$ در $x=a$ مشتق پذیر است و مقدار آن را با نماد $f'(a)$ نمایش می‌دهیم.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

تعریف دیگری که با تعریف فوق همان‌زمان است به صورت زیر است:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

تذکر: اگر این عدد یکتاً نشود و یا وجود نداشته باشد، تابع $f(x)$ در نقطه‌ی $x=a$ مشتق نپذیر است.

برای محاسبه مشتق تابع در یک نقطه از یکی از روش‌های زیر استفاده می‌شود.

$$1) f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$2) f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

در روش اول به شکل زیر عمل می‌کنیم:

۱. محسوبه $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ که دارای ابعاً $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ است و روش‌های رفع ابعاً آن را در مردیدیم.

در روش دوم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

۱. محسوبه $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ که دارای ابعاً $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ است.

۸۶) با استفاده از تعریف مشتق، مشتق پذیری تابع $f(x) = x|x-2|$ در نقطه $x=2$ مورد بررسی قرار دهید. (شهریور ۹۴)

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x|x-2| - 2}{x - 2} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x-2)}{x-2} = 2 = f'(2^+) \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x(x-2)}{x-2} = -2 = f'(2^-) \end{cases}$$

تابع در این نقطه مشتق پذیر نیست. زیرا مشتق پهپ و راست آن با هم برابر نیست.

۸۷) با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع $f(x) = x^3 + 1$ در نقطه‌ی $x=a$ محاسبه کنید. (خرداد ۹۴)

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^3 + 1 - a^3 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^3 + 3ah^2 + 3a^2h + h^3 - a^3 - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3ah^2 + 3a^2h + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 3a + h = 3a \end{aligned}$$

۸۸) با استفاده از تعریف، مشتق تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ را در نقطه $x=1$ بررسی کنید. (خواهم: ۹۴)

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1-x}{x}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x} = -1$$

۸۹) مشتق پذیری تابع $f(x) = |x^3 - 1|$ را در نقطه $x = 1$ بررسی کنید.


$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^3 - 1|}{x - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2 = f'_+(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)(x+1)}{x-1} = -2 = f'_-(1) \end{cases}$$

تابع در این نقطه مشتق‌نپذیر است.

۹۰) مشتق تابع $f(x) = x^7 + 3x - 4$ را در نقطه $x = 1$ با استفاده از تعریف مشتق بیابید.

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 + 3x - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 6 \quad (\text{راه اول}) \\ f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^7 + 3(1+h) - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h^7 + 7h^6 + 21h^5 + 35h^4 + 35h^3 + 21h^2 + 7h + 1) + (3+7h) - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^7 + 7h^6 + 21h^5 + 35h^4 + 35h^3 + 21h^2 + 7h + 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h^7 + 7h^6 + 21h^5 + 35h^4 + 35h^3 + 21h^2 + 7h + 1) = 6 \quad (\text{راه دوم}) \end{aligned}$$


۹۱) با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع $f(x) = \sqrt{4-x}$ را به دست آورید.



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-(x+h)} - \sqrt{4-x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-(x+h)} - \sqrt{4-x}}{h} \times \frac{\sqrt{4-(x+h)} + \sqrt{4-x}}{\sqrt{4-(x+h)} + \sqrt{4-x}} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4-(x+h) - 4+x}{h(\sqrt{4-(x+h)} + \sqrt{4-x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h(\sqrt{4-(x+h)} + \sqrt{4-x})} = \frac{-1}{2\sqrt{4-x}} \end{aligned}$$

مشتق راست: در تابع $f(x) = \sqrt{4-x}$ اگر $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ موجود باشد (عدد شود) این حد را مشتق راست تابع $f(x)$ در $x = a$ نامیده و با نماد $f'_+(a)$ نشان می‌دهند.

مشتق چپ: در تابع $f(x) = \sqrt{4-x}$ اگر $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ موجود باشد (عدد شود) این حد را مشتق چپ تابع $f(x)$ در $x = a$ نامیده و با نماد $f'_-(a)$ نشان می‌دهند.



هر تابع مشتق پذیر، پیوسته است ولی هر تابع پیوسته‌ای مشتق پذیر نیست.
عملای پیوستگی شرط لازم مشتق پذیری است ولی کافی نیست.
یعنی توابعی وجود دارند که پیوسته‌اند ولی مشتق پذیر نیستند.



اگر تابعی در $x = a$ فقط پیوستگی راست داشته باشد در آن نقطه مشتق چپ ندارد و مشتق راست نیز باید بررسی شود و همچنین اگر تابعی فقط پیوستگی چپ داشته باشد در آن نقطه مشتق راست ندارد و مشتق چپ آن باید بررسی شود.



برای حل مسائل مربوط به مشتق پذیری در یک نقطه به روش زیر عمل کنید:

۱) پیوستگی تابع در $x = a$ را بررسی کنید. یعنی باشد $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ اگر یکی از پیوستگی‌ها برقرار نبود مشتق آن نیز وجود ندارد. (عدم وجود مشتق را بیان کنید. به فضای مخصوص در توابع قدرمطلقی، پند فناraphای و برآتنی)

۲) مشتق پل و راست را از راه تعریف بررسی می‌کنیم. اگرداشته باشیم: $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ عدد شود می‌گوییم تابع در $x = a$ مشتق پذیر است.

۹۲) با استفاده از تعریف مشتق، مشتق‌های چپ و راست تابع $f(x) = |x - 2|$ را در $x = 2$ در صورت وجود بیابید. (خرداد ۹۲)

پاسخ: تابع در $x = 2$ مشتق پذیر نیست.

بررسی پیوستگی

$$\lim_{x \rightarrow 2} |x - 2| = + = f(2) \Rightarrow f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2| - 0}{x - 2} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{x - 2} = 1 = f'_+(2) \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x - 2)}{x - 2} = -1 = f'_-(2) \end{cases}$$

۹۳) در جاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید:

الف) دامنهٔ مشتق پذیری تابع $f(x) = \sqrt{x}$ برابر است با

ب) شیب خط مماس بر نمودار تابع $g(x) = \frac{1}{x}$ در $x = 1$ برابر است با

پاسخ:

الف) $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow D_f = [0, +\infty)$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow D_{f'} = (0, +\infty)$$

ب) $g'(x) = \frac{-1}{x^2} \Rightarrow m = g'(1) = -1$

پوایی نهایی

پوایی نهایی

۹۴) پاسخ هر عبارت ستون A را از بین گزینه‌های ستون B انتخاب کنید.

B		ستون
۱) صفر	(الف)	
۲) $\frac{1}{2}$	(ب) $(\frac{1}{2}, +\infty)$	
۳) $(-\infty, \frac{1}{2})$	(ج) وجود ندارد	

A		ستون
۱) دامنهٔ مشتق پذیری تابع $y = \sqrt{1 - 2x}$ کدام است؟		
۲) مشتق چپ تابع $y = [2x]$ در نقطهٔ ۱ کدام است؟		
۳) در تابع $y = 2 - x $ حاصل $f'_+(2) + f'_-(2)$ کدام است؟		

پاسخ:

۱) گزینهٔ «و» صحیح است.

$$1 - 2x \geq 0 \Rightarrow D_f = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \Rightarrow f'(x) = \frac{-2}{2\sqrt{1 - 2x}} \Rightarrow D_{f'} = (-\infty, \frac{1}{2})$$

۲) گزینهٔ «ج» صحیح است. تابع در $x = 1$ پیوستگی چپ ندارد، بنابراین مشتق چپ آن وجود ندارد.

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|2 - x| - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{x - 2} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x - 2}{x - 2} = -1 \end{cases} \Rightarrow f'_+(2) + f'_-(2) = 0$$



روش‌های محاسبه‌ی مشتق توابع:

$$f(x) = c \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 0$$

$$f(x) = \sin^r x + \cos^r x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = (1)^r = \dots$$

$$f(x) = ax^n \Rightarrow f'(x) = nax^{n-1}$$

$$f(x) = au^n \Rightarrow f'(x) = anu^{n-1}u'$$

$$f(x) = x^y \Rightarrow f'(x) = yx^{y-1}$$

$$h(x) = f(x) \pm g(x) \quad \Rightarrow \quad h'(x) = f'(x) \pm g'(x)$$

$$h(x) = f(x) \times g(x) \quad \Rightarrow \quad h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$

$$f(x) = (rx^r + rx - 1)(rx^r + rx^r + r) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = (rx + r)(rx^r + rx^r + r) + (rx^r + rx)(rx^r + rx - 1)$$

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \Rightarrow \quad h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}$$

$$h(x) = \frac{x^r + 1}{x - 1} \quad \Rightarrow \quad h'(x) = \frac{rx(x-1) - (1)(x^r + 1)}{(x-1)^r}$$

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$$

$$f(x) = \frac{au+b}{cu+d} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{ad-bc}{(cu+d)^2} u'$$

$$f(x) = \sqrt[n]{u^m} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{mu'}{n\sqrt[n]{u^{n-m}}}$$

نکته

۹۵) مشتقة بگیرید.

$$1) f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{2}(1)x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\forall f(x) = \left(\frac{rx+1}{x-r}\right)^r \Rightarrow f'(x) = (r)\left(\frac{(x-r)-(1)(rx+1)}{(x-r)^r}\right)\left(\frac{rx+1}{x-r}\right)^{r-1}$$

$$\text{r) } f(x) = \frac{(rx^r - 1)}{x+1} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{r(rx)(rx^{r-1} - 1)(x+1) - (rx^r - 1)^r(1)}{(x+1)^2}$$

$$\text{f)} \quad y = \sqrt{x} (\ln x - 1)^{\alpha} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{\sqrt{x}} (\ln x - 1)^{\alpha} + \alpha (\ln x) (\ln x - 1)^{\alpha-1} \sqrt{x}$$

$$\text{d)} \quad y = \frac{x^r - 1}{(rx + \delta)^r} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{rx(rx + \delta)^{r-1} + r(r)(rx + \delta)(x^{r-1})}{(rx + \delta)^r}$$

۹۶) مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.)

$$1) f(x) = \left(\frac{2x+1}{x} \right)^4$$

$$2) g(x) = (\sqrt{5-7x})(4 - \frac{x}{3})$$

پاسخ:

$$1) y' = 4\left(\frac{2(x)-(1)(2x+1)}{x^2}\right)\left(\frac{2x+1}{x}\right)^3$$

$$2) y' = \frac{-7}{2\sqrt{5-7x}}(4 - \frac{x}{3}) - \frac{1}{3}(\sqrt{5-7x})$$

مشتق توابع مرکب

فرض کنیم تابع $g(x)$ در نقطه $x=a$ مشتق پذیر و تابع $f(x)$ در $x=a$ مشتق پذیر باشد. آن‌گاه تابع $h(x)=f(g(x))$ در $x=a$ مشتق پذیر است و داریم:

$$h(x)=f(g(x)) \Rightarrow h'(a)=g'(a)f'(g(a))$$

$$(f(u))' = u'f'(u), \quad ((u^m))' = m(u')(u)^{m-1}$$

اگر $f(\sqrt{x-1})$ در $x=5$ باشد، مشتق تابع $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2-h)-f(2)}{h} = \frac{-2}{3}$ را به دست آورید.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)-f(2)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)-f(2)}{-h} = -f'(2) = \frac{-2}{3} \Rightarrow f'(2) = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow (f(\sqrt{x-1}))' = \left(\frac{1}{2\sqrt{x-1}} f'(\sqrt{x-1}) \right)_{x=5} = \frac{1}{4} f'(2) = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{1}{6}$$

اگر $f'(x) = \frac{1}{2x^2+3}$ باشد، آن‌گاه مشتق تابع $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ را در $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ به دست آورید.

پاسخ:

$$(f\left(\frac{1}{x}\right))' = \frac{-1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)_{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \left(\frac{-1}{x^2} \right) \times \left(\frac{1}{2\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 3} \right)_{\frac{1}{\sqrt{2}}} = -2 \times \frac{1}{2 \times (2) + 3} = \frac{-2}{7}$$

(همانگ کشوری ۸۵) اگر $y=f(5x^2-x)$ باشد، مشتق تابع $y=f'(x)=\sqrt{x^2+1}$ را نسبت به x تعیین کنید.

پاسخ:

$$y=f(5x^2-x) \Rightarrow y'=(5x^2-x)'f'(5x^2-x) \Rightarrow y'=(10x-1)f'(5x^2-x)=(10x-1)\sqrt{(5x^2-x)^2+1}$$

۱۰۰) مشتق $f(\sqrt[5]{6x+2})$ در نقطه $x=1$ برابر -2 است. مشتق تابع f در نقطه‌ای به طول 2 کدام است؟


$\sqrt[5]{6x+2}=2 \Rightarrow x=1$

پاسخ:

$$\sqrt[5]{6x+2}=2 \Rightarrow x=1 \Rightarrow (f(\sqrt[5]{6x+2}))_{x=1} = \left(\frac{6}{5\sqrt[5]{(6x+2)^4}} f'(\sqrt[5]{6x+2}) \right)_{x=1} = \frac{6}{12} f'(2) = -2 \Rightarrow f'(2) = -4$$



شیب خط مماس بر منحنی و معادلهٔ خط مماس و قائم در نقطه‌ای روی منحنی:



اگر خط L در نقطه‌ای به طول a واقع بر منحنی نمایش تابع $y = f(x)$ مماس باشد،
شیب خط مماس از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$m = \tan \theta = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

شیب خط مماس در نقطه‌ی A

$$A \left| \begin{array}{l} a \\ f(a) \end{array} \right.$$

۱) اول مفهومیات نقطه‌ای که می‌فواهیم مماس یا قائم در آن را بنویسیم معلوم کنید.

۲) از تابع $f(x)$ مشتق بگیرید و $f'(a)$ را تعیین کنید این همان شیب خط مماس است. $m = f'(a)$ و $m' = \frac{-1}{f'(a)}$ شیب خط قائم است. (بعضی وقتاً این مشتق را از راه تعریف می‌فوان)

۳) معادلهٔ خط مماس و معادلهٔ خط قائم به شکل زیر نوشته می‌شوند:

$$L: y - f(a) = f'(a)(x - a) \quad \text{خط مماس}$$

$$L': y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)}(x - a) \quad \text{خط قائم}$$

۱۰۱) با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع $y = x^3$ را در نقطه‌ای به طول ۱ محاسبه نماید. سپس به کمک آن معادلهٔ خط مماس بر منحنی این تابع را در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر منحنی تابع بنویسید.
(شهریور ۹۴ خارج کشور)

پاسخ:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1 - (1 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$$

$$A \left| \begin{array}{l} 2 \\ (2)^3 - 1 = 3 \end{array} \right. \Rightarrow L: y - 3 = 3(x - 2)$$

۱۰۲) معادلهٔ خط مماس بر نمودار تابع $y = \frac{x}{x-2}$ را در نقطه‌ی $A(3, 3)$ به دست آورید.
(خرداد ۹۲)

$$y' = \frac{-1}{(x-2)^2} \Rightarrow m = y'(3) = -\frac{1}{3} \Rightarrow y - 3 = -\frac{1}{3}(x - 3) \quad \text{پاسخ:}$$

۱۰۳) با استفاده از تعریف، مشتق تابع $y = x^3$ را در نقطه دلخواه a حساب کنید. سپس معادلهٔ خط قائم بر نمودار تابع را در نقطه $A(1, 1)$ به دست آورید.
(پاسخ:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^2 + ax + a^2)}{x - a} = 3a^2$$

$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(1) = 3(1)^2 = 3 = m \Rightarrow m' = \frac{-1}{3} \Rightarrow L: y - 1 = \frac{-1}{3}(x - 1) \quad \text{خط قائم}$$

۱۰۴) معادلهٔ خط مماس بر تابع $y = \sqrt[3]{x-1}$ در نقطه‌ی $1 = x$ را بنویسید.
(پاسخ:

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1} \Rightarrow f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \frac{1}{1^2} = +\infty$$

بنابراین خط مماس بر تابع در $x = 1$ خطی موازی محور y هاست و معادلهٔ آن همان طول نقطه است.



شیب خط مماس بر تابع، تغییر آهنگ یا تغییر آنی، تغییرات لحظه‌ای، همگی یعنی مشتق تابع در نقطه‌ی داده شده

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = m = A(a, f(a))$$

(۱۰۵) تابع $f(x) = x^2 + 5x + 4$ با ضابطه‌ی $f(x)$ داده شده است.

الف) دستور کلی آهنگ متوسط تغییر این تابع را نسبت به متغیر x تعیین کنید.

ب) آهنگ متوسط تغییر این تابع را وقتی $x = 3 / 4$ ، $\Delta x = 0 / 4$ را به دست آورید.

ج) آهنگ آنی را در $x = 3$ به دست آورید.

پاسخ: $\boxed{\square}$

(الف)
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x)^2 + 5(x + \Delta x) + 4 - (x^2 + 5x + 4)}{\Delta x}$$

(ب)
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(3 + 0 / 4)^2 + 5(3 + 0 / 4) + 4 - ((3)^2 + 5(3) + 4)}{0 / 4} = \frac{1 / 2 + 0 / 16 + 2}{0 / 4} = \frac{3 / 36}{0 / 4}$$

(ج)
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) \Rightarrow f'(3) = (x^2 + 5x + 4)'_x = (2x + 5)_x = 11$$

(۱۰۶) اگر $f(t) = t^2 + 3t$ نمایش جمعیت یک نوع باکتری در زمان t باشد ، نسبت آهنگ متوسط تغییر f در بازه‌ی زمانی $1 / 2 \leq t \leq 1$ به آهنگ لحظه‌ی تغییر f در $t = 1$ کدام است ؟

$$\frac{f(1/2) - f(1)}{1/2 - 1} = \frac{((1/2)^2 + 3(1/2)) - (1+3)}{0/2} = \frac{10/4}{2} = 5/2$$

$$f'(1) = (2t + 3)_{x=1} = 5 \Rightarrow \frac{5/2}{5} = 1/04$$

(۱۰۷) در چه نقطه‌ای از بازه $[9, 25]$ آهنگ لحظه‌ای $f(x) = \sqrt{x}$ با آهنگ متوسط آن برابر است ؟

$$\frac{f(25) - f(9)}{25 - 9} = \frac{\sqrt{25} - \sqrt{9}}{16} = \frac{2}{16} , \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 16$$

(۱۰۸) گنجایش ظرفی 40 لیتر مایع است. در لحظه $t = 0$ سوراخی در ظرف ایجاد می‌شود اگر حجم مایع باقی مانده در ظرف پس از t ثانیه از رابطه‌ی

$$V(t) = 40 \left(1 - \frac{t}{100}\right)^8$$

$$\frac{V(100) - V(0)}{100 - 0} = \frac{0 - 40}{100} = -4 \quad , \quad V'(t) = 8 \left(\frac{-1}{100}\right) \left(1 - \frac{t}{100}\right)^7 = \frac{-8}{100} \left(1 - \frac{t}{100}\right)^7 = \frac{-4}{100}$$

$$2 - \frac{t}{50} = 1 \Rightarrow t = 50$$

حالا آهنگ تغییر رو مساوی تغییرات متوسط قرار می‌دیم

فصل ۵ کاربرد مشتق

برای تعیین یکنواخت تابع پیوسته $(x) f$ (صعودی یا نزولی بودن تابع)، ابتدا از تابع مشتق می‌گیریم و تابع مشتق را تعیین علامت می‌کنیم در بازه‌هایی که مشتق مثبت باشد، یعنی تابع صعودی است و در بازه‌هایی که مشتق منفی است، یعنی تابع نزولی است.

x	x_1	x_2
f'	+	-
f	↗	↘



روش حل
مسئله

۱) اول از تابع مشتق بگیرید.

۲) معادله $0 = f'(x)$ را حل کنید و ریشه‌های مشتق را به دست آورید.

۳) با توجه به ریشه‌ها، مشتق را تعیین علامت کنید. (ممکن است احتیاج به هرچند داشته باشید.)

۴) در هر بازه‌ای که علامت مشتق مثبت باشد یعنی تابع $(x) f$ صعودی است. و در هر بازه‌ای که علامت مشتق منفی باشد یعنی تابع $(x) f$ نزولی است.

۱۰۹) در چه بازه‌ای تابع $f(x) = 2x^3 - 18x$ صعودی است؟

پاسخ:

$$f(x) = 2x^3 - 18x \Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 18 = 0 \Rightarrow x = 3$$

x	$x = 3$
f'	- +

تابع در بازه‌ی $(-\infty, 3)$ نزولی و در بازه‌ی $(3, +\infty)$ صعودی است.

۱۱۰) تعیین کنید تابع $f(x) = 2x - \sqrt{x}$ در کدام بازه نزولی است

پاسخ:

یعنی باید بازه‌ای را تعیین کنیم که مشتق تابع در این بازه همواره منفی باشد.

$$f'(x) = 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}} < 0 \Rightarrow 2 < \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} < \frac{1}{4} \Rightarrow x < \frac{1}{16} \xrightarrow{\text{با توجه به (امنه)}} 0 \leq x < \frac{1}{16}$$

۱۱۱) تابع $f(x) = \frac{1}{x^2}$ را روی بازه $(0, +\infty)$ در نظر بگیرید. صعودی یا نزولی بودن این تابع را روی بازه $(0, +\infty)$ تعیین کنید.

پاسخ:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{-2x}{x^4} = \frac{-2}{x^3} \Rightarrow \forall x \in (0, +\infty) \quad f'(x) < 0$$

بنابراین در بازه $(0, +\infty)$ تابع نزولی است.

۱۱۲) تابع $f(x) = \frac{2}{x} + x^2$ در چه فاصله‌ای صعودی است؟

پاسخ:

$$f(x) = \frac{2}{x} + x^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{-2}{x^2} + 2x = \frac{2(x^2 - 1)}{x^2} \geq 0 \Rightarrow x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

نقاط بحرانی

نقطه $x = a$ متعلق به دامنه تابع را نقطه بحرانی تابع f می‌نامند هرگاه در یک همسایگی متقارن پیرامون این نقطه تابع تعریف شده باشد و مشتق تابع در این نقطه صفر یا وجود ندارد، شود.

$$\begin{cases} 1) & a \in D_f \\ 2) & f'(a) = 0 \quad \vee \quad f'(a) \text{ وجود ندارد} \end{cases}$$

برای به دست آوردن نقاط بحرانی تابع با توجه به دامنه از تابع مشتق می‌گیریم و می‌پرسیم f' کجا صفر می‌شود یا کجا وجود ندارد.


أنواع وجود ندارد : الف کجا ناپیوسته است ب) کجا مشتق چپ و راست نابرابرند ج) کجا مشتق بی نهایتی می‌شود.

(۱۱۳) نقاط بحرانی تابع با ضابطه $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2}$ را به دست آورید.

$$D_f = \mathbb{R}, f'(x) = \frac{3x^2 - 6x}{\sqrt[3]{(x^3 - 3x^2)^2}} \Rightarrow \begin{cases} f' = 0 & 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2 \\ f' \text{ وجود ندارد} & x^3 - 3x^2 = x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3 \end{cases}$$

مجموعه نقاط بحرانی: $\{0, 2, 3\}$

(۱۱۴) نمودار تابع $f(x) = |x^3 - 4x|$ رسم کنید و نقاط بحرانی تابع را تعیین کنید.




$\begin{cases} f'_-(0) = -4, & f'_+(0) = 4 \\ f'_-(4) = -4, & f'_+(4) = 4 \end{cases}$ در $x=4, x=0$ مشتق وجود ندارد
این نقاط زاویه دارند.

تابع سه نقطه بحرانی دارد. $\{0, 2, 4\}$

با توجه به تعریف نقاط ابتدا و انتهای بازه نقاط بحرانی تابع نیستند.


واژه اکسترم نسبی برای ماکسیمم و مینیمم تابع بکار برده می‌شود که تعاریف آنها به شرح زیر است.

نقطه $x = c$ طول ماکسیمم نسبی تابع f است که اوّل‌در یک همسایگی متقارن این نقطه تابع تعریف شده باشد، و ثانیاً عرض این نقطه از تمامی عرض‌های این همسایگی بزرگتر یا مساوی است. به زبان ریاضی یعنی:



در این حالت $f(c)$ را مقدار ماکسیمم نسبی تابع f می‌نامند.

نقطه $x = c$ طول مینیمم نسبی تابع f است که اوّل‌در یک همسایگی متقارن این نقطه، تابع تعریف شده باشد، و ثانیاً عرض این نقطه از تمامی عرض‌های این همسایگی کوچک‌تر یا مساوی است. به زبان ریاضی یعنی:



در این حالت $f(c)$ را مقدار مینیمم نسبی تابع f می‌نامند.

نقاط ابتدا و انتهای بازه نمی‌توانند اکسترم نسبی باشند زیرا تابع در همسایگی متقارن آن‌ها تعریف نشده.


قضیه فرما: اگر در نقطه‌ی $x = a$ تابع $f(x)$ ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد، و $f'(a) = 0$ موجود باشد آنگاه خواهد بود به عبارت دیگر هر نقطه اکسترم نسبی تابع یک نقطه بحرانی آن است ولی عکس قضیه فرما در حالت کلی درست نیست.

ماکسیمم مطلق: اگر $x = a$ نقطه‌ای از دامنه تابع به طوری که برای هر $x \in D_f$ داشته باشیم $f(a) \geq f(x)$ یعنی عرض نقطه a از تمامی عرض‌های این تابع در تمام دامنه بزرگتر یا مساوی باشد. آنگاه $f(a)$ ماکسیمم مطلق تابع f می‌نامیم.


مینیمم مطلق: اگر $x = a$ نقطه‌ای از دامنه تابع به طوری که برای هر $x \in D_f$ داشته باشیم $f(a) \leq f(x)$ یعنی عرض نقطه a از تمامی عرض‌های این تابع در تمام دامنه کوچکتر یا مساوی باشد. آنگاه $f(a)$ مینیمم مطلق تابع f می‌نامیم.

در توابع یکنوا به راحتی ماکسیمم و مینیمم مطلق را می‌توان تعیین نمود.

$$\text{if } \forall x \in (a, b) \quad f'(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad f \uparrow \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_{\max} = f(b) \\ y_{\min} = f(a) \end{cases}$$



$$\text{if } \forall x \in (a, b) \quad f'(x) < 0 \quad \Rightarrow \quad f \downarrow \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_{\max} = f(a) \\ y_{\min} = f(b) \end{cases}$$



هر تابع پیوسته در بازه‌ای بسته ماکسیمم و مینیمم مطلق دارد.

برای تعیین \min, \max مطلق تابع پیوسته $y = f(x)$ در بازه $[a, b]$ ابتدا نقاط بحرانی تابع را تعیین کرده و جدول زیر را تنظیم می‌کنیم.

X	a	x_1	x_2	x_3	x_4	x_n	b
$f(x)$	$f(a)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	$f(x_4)$	$f(x_n)$	$f(b)$

سطر اول نقاط بحرانی تابع در این فاصله و نقاط ابتدا و انتهای بازه و سطر دوم مقادیر تابع به ازای این نقاط می‌باشد. آنگاه بیشترین مقدار سطر دوم ماکسیمم مطلق و کمترین مقدار سطر دوم مینیمم مطلق تابع در این بازه خواهد بود.

ریاضی ۳ به سبک روحانی	کیمیای ماهان	دانلود از سایت ریاضی سرا
-----------------------	--------------	--------------------------

۱۱۵) بیشترین مقدار تابع $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ در بازه $[-2, 2]$ کدام است؟

ابتدا از تابع مشتق می‌گیریم و نقاط بحرانی را تعیین و مقادیر تابع به ازای این نقاط را به دست می‌آوریم. عرض نقاط بحرانی تابع را بازه $(-2, 2)$

$$f = x^3 - 3x^2 - 9x + 5 \Rightarrow f' = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10 \\ x = 3 \notin (-2, 2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(-2) = -8 - 12 + 18 + 5 = 3 \\ f(2) = 8 - 12 - 18 + 5 = -17 \end{cases}$$

عرض تابع را در نقاط ابتدایی و انتهایی این بازه به دست می‌آوریم. داریم:

در آخر بین مقادیر به دست آمده، بیشترین مقدار را به عنوان ماکزیمم مطلق تابع در این بازه معرفی می‌کنیم:

x	-2	-1	2
f(x)	3	10	-17

$$y_{\max} = 10$$

۱۱۶) ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع $f(x) = |x| (x+1)$ در فاصله $[-2, 1]$ را به دست آورید.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & x > 0 \\ -x^2 - x & x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x+1 & x > 0 \Rightarrow 2x+1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} & \text{غایق} \\ -2x-1 & x < 0 \Rightarrow -2x-1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} & \text{غایق} \end{cases}$$

x	-2	$-\frac{1}{2}$	*	1
f(x)	-2	$-\frac{1}{4}$	*	2

ماکزیمم مطلق

مینیمم مطلق


۱۱۷) به ازای چه مقادیر a و b نقطه A $\left(\frac{-1}{2}, 0\right)$ تابع $y = x^2 + ax + b$ می‌باشد؟

پاسخ: اگر یک نقطه اکسترمم یک تابع چند جمله‌ای خطی باشد اول باید مختصاتش در ضابطه تابع صدق کنه و ثانیاً طول این نقطه باشد مشتق اول تابع را صفر کنه.

$$y' = 2x + a = 0 \Rightarrow x = \frac{-a}{2} = -1 \Rightarrow a = 2$$

$$f(-1) = 1 - 2 + b = 0 \Rightarrow b = 1$$

در توابع ناپیوسته در حالت کلی نمی‌توان از نکته فوق برای تعیین ماکسیمم و مینیمم مطلق استفاده نمود، و بهتر است نمودار تابع، مورد بررسی قرار گیرد.



۱۱۸) اگر تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & ; x < 1 \\ a & ; x = 1 \\ 3 - 2x & ; x > 1 \end{cases}$ ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد، a چند مقدار صحیح را نمی‌تواند بپذیرد؟

پاسخ با توجه به شکل داریم:

$$() \quad 1 \geq a \geq -1 \Rightarrow a \in [-1, 1] \quad () \quad 1 < a < -1 \Rightarrow a \in (-1, 1)$$

پس a سه مقدار صحیح -1 و 1 و 0 را نمی‌تواند بپذیرد.




روش کلی بهینه سازی :

- ۱- در صورت نیاز ترسیم شکل برای درک بهتر مسئله . (به خصوص هنگامی که ایده ای اولیه ندارید)
- ۲- ایجاد رابطه بین معلومات و مجھولات مسئله و فرموله کردن آن و تبدیل آن به یک تابع یک متغیره.
- ۳- پس از تشکیل تابع مسئله ، نقاط بحرانی تابع را تعیین ، مقادیر تابع ، به ازاء نقاط بحرانی را به دست می آوریم و با نوجه به ماهیت سوال ، ماکزیمم یا مینیمم حاصل از تابع جواب مسئله خواهد بود.


(۱۱۹) کم ترین فاصله منحنی $y = x^2$ از خط $y - 4x + 2 = 0$ را به دست آورید ؟

$$h(x) = \frac{|x^2 - 4x + 2|}{\sqrt{1+16}} \Rightarrow h'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow h(2) = \frac{|4 - 8 + 2|}{\sqrt{17}} = \frac{2}{\sqrt{17}}$$

(۱۲۰) اگر قاعده مثلث ۳۶ و ارتفاع آن ۱۲ باشد در شکل مقابل بیشترین مساحت ناحیه هاشور زده کدام است ؟



اینها تالس زدیم



پاسخ

$$\frac{x}{36} = \frac{12-y}{12} \Rightarrow x = 3(12-y) \Rightarrow S = xy \Rightarrow S = 3(12-y)y = 36y - 3y^2$$

$$S'_y = 36 - 6y = 0 \Rightarrow y = 6 \Rightarrow S_{\max} = S_{(y=6)} = (36)(6) - 3(6)^2 = 108$$



(۱۲۱) اگر شعاع ربع دایره ۳ باشد ، بیش ترین مساحت مستطیل محاط شده در شکل را بدست آورید .

پاسخ

$$y = \sqrt{9 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$S(x) = xy = x\sqrt{9 - x^2} \Rightarrow S'(x) = \sqrt{9 - x^2} + \frac{-x^2}{\sqrt{9 - x^2}} = \frac{9 - 2x^2}{\sqrt{9 - x^2}} = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{2} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{9}{2}}$$

x	۰	$\sqrt{\frac{9}{2}}$	۳
S(x)	۰	$\frac{9}{2}$	۰

(۱۲۲) غلظت یک داروی شیمیابی در خون t ساعت پس از تزریق از رابطه $f(t) = \frac{t}{t^2 + 54}$ به دست می آید چند ساعت پس از تزریق غلظت آن در خون بیشترین مقدار ممکن را خواهد داشت .

پاسخ

$$f'(t) = \frac{1 \times (t^2 + 54) - 2t^2 \times t}{(t^2 + 54)^2} = \frac{-2t^2 + 54}{(t^2 + 54)^2} \Rightarrow f'(t) = 0 \Rightarrow -2t^2 + 54 = 0 \Rightarrow t^2 = 27 \Rightarrow t = 3$$

فیصله ۶ هندسه

اگر خط d را حول محور L (که با آن متقاطع است) دوران دهیم. دو تا مخروط ایجاد می شود که در راس به هم متصل شده اند. حال اگر رویه مخروطی را با صفحه p قطع دهیم . موارد زیر رخ می دهد .


الف) صفحه p بر محور L عمود باشد . دایره حاصل می شود .

ب) صفحه p بر محور L عمود نباشد و موازی مولد d هم نباشد بیضی حاصل می شود .

ج) صفحه p موازی محور L مخروط باشد . هذلولی حاصل می شود .

د) صفحه p موازی مولد d باشد . سهمی حاصل می شود .

ه) صفحه p از راس دو مخروط بگذرد . نقطه حاصل می شود .



اگر کره را با یک صفحه قطع دهیم همواره سطح مقطع دایره خواهد بود .

اگر یک استوانه قائم را با یک صفحه قطع دهیم ممکن است مستطیل ، بیضی ، دایره ایجاد شود .

اگر پاره خطی حول محوری موازی خودش دوران کند سطح استوانه حاصل می شود .

اگر یک مستطیل حول یکی از اضلاعش دوران کند استوانه ساخته می شود .

اگر یک مربع یا لوگی حول یک قطر خود دوران کند دو مخروط حاصل می شود .

۱۲۳) جا های خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

۱ - شکل حاصل از دوران یک ربع دایره حول شعاع عمود بر قطر آن یک است .

۲ - شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضلاع قائمه است .


۳ - شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول وتر آن است .

۴ - اگر یک لوگی با طول قطر های ۶ و ۴ را حول قطر بزرگ آن دوران دهیم حجم شکل حاصل است .

۱) نیمکره $\frac{8\pi}{4}$ دو مخروط هم قاعده به حجم

۲) مخروط $\frac{2}{3}$ دو مخروط هم قاعده

۳) دو مخروط هم قاعده به حجم




۱۲۴) اگر مثلث قائم الزاویه شکل روبرو را حول خط d دوران دهیم حجم شکل حاصل را به دست آورید .

با این دوران حجم حاصل عمل تفاضل حجم استوانه از مخروط خواهد بود .

$$V = V_o - V_m = \pi(3)^2(6) - \frac{1}{3}\pi(3)^2(6) = 36\pi$$

بیم مورد نظر
 بیم استوانه
 بیم مخروط

۱۲۵) در شکل مقابل حجم حاصل از دوران شکل ، حول خط Δ هنگامی که قطر نیم دایره ۴ باشد را به دست آورید .



با این دوران حجم حاصل عمل تفاضل حجم استوانه ای با شعاع ۴ و ارتفاع ۷ و یک کره با شعاع ۲ خواهد بود .

$$V = V_o - V_k = \pi(4)^2(7) - \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \pi(\frac{304}{3})$$

بیم مورد نظر
 بیم استوانه
 بیم کره




بیضی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فواصل آن ها از دو نقطه ثابت (کانون ها F' , F) مقدار ثابت $2a$ است که $2a$ طول قطر بزرگ یا کانونی بیضی نامیده می شود.

$$AA' = 2a, \quad BB' = 2b, \quad FF' = 2c, \quad MF + MF' = 2a, \quad a^r = b^r + c^r$$

قطر کانونی

قطر ناکانونی

فاصله کانونی



در شکل مقابل

(۱) نقاط F و F' را کانون های بیضی می گوییم.(۲) فاصله بین دو کانون را که مقدار ثابتی است فاصله کانونی بیضی می گوییم و آن را برابر $F'F = 2c$ فرض می کنیم.(۳) پاره خط $A'A$ را قطر بزرگ و محور کانونی و پاره خط $B'B$ را قطر کوچک و محور ناکانونی می گوییم.

مختصات نقاط مهم در بیضی افقی

$$O = \frac{A+A'}{2} = \frac{B+B'}{2} = \frac{F+F'}{2} \quad \text{و} \quad O \left|_{\beta}^{\alpha} \right. \begin{matrix} A \left|_{\beta+a}^{\alpha+a} \right. \\ A' \left|_{\beta-a}^{\alpha-a} \right. \end{matrix} \quad F \left|_{\beta+c}^{\alpha+c} \right. \quad F' \left|_{\beta-c}^{\alpha-c} \right. \quad B \left|_{\beta+b}^{\alpha} \right. \quad B' \left|_{\beta-b}^{\alpha} \right.$$



مختصات نقاط مهم در بیضی قائم

$$O \left|_{\beta}^{\alpha} \right. \begin{matrix} x_A + x_{A'} &= x_B + x_{B'} &= x_F + x_{F'} \\ \frac{x_A + x_{A'}}{2} &= \frac{x_B + x_{B'}}{2} &= \frac{x_F + x_{F'}}{2} \\ y_A + y_{A'} &= y_B + y_{B'} &= y_F + y_{F'} \\ \frac{y_A + y_{A'}}{2} &= \frac{y_B + y_{B'}}{2} &= \frac{y_F + y_{F'}}{2} \end{matrix}$$

$$O \left|_{\beta}^{\alpha} \right. \begin{matrix} A \left|_{\beta+a}^{\alpha} \right. \\ A' \left|_{\beta-a}^{\alpha} \right. \end{matrix} \quad F \left|_{\beta+c}^{\alpha} \right. \quad F' \left|_{\beta-c}^{\alpha} \right. \quad B \left|_{\beta+b}^{\alpha+b} \right. \quad B' \left|_{\beta-b}^{\alpha-b} \right.$$

خروج از مرکز : در هر بیضی نسبت $e = \frac{c}{a}$ را خروج از مرکز بیضی می گویند.

$$\circ < FF' < MF + MF' \Rightarrow \circ < 2c < 2a \Rightarrow \circ < \frac{c}{a} = e < 1$$


if $e \rightarrow 1$ if $e \rightarrow 0$ 

مخرج از مرکز چاقی و لاغری بیضی را نشان می دهد هرچه کمتر چاق تر

(۱۲۶) کانون های یک بیضی $F'(2,2), F(14,2)$ هستند و خروج از مرکز آن $\frac{3}{5}$ است. B, B', A, A' را تعیین کنید و نمودار آن را رسم کنید.

$$O = \frac{F+F'}{2} \Rightarrow O \left|_{\beta}^{\alpha} \right. \begin{matrix} \alpha = \frac{2+14}{2} = 8 \\ \beta = \frac{2+2}{2} = 2 \end{matrix}, \quad 2c = |FF'| = \sqrt{(14-2)^2 + (2-2)^2} = 12 \Rightarrow c = 6, \quad e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{6}{a} \Rightarrow a = 10$$

$$b = \sqrt{a^r - c^r} = \sqrt{100 - 36} = 8 \Rightarrow A \left|_{\beta}^{\alpha+10} = 18 \right. \quad A' \left|_{\beta}^{\alpha-10} = -2 \right. \quad B \left|_{\beta+8}^{\alpha} = 10 \right. \quad B' \left|_{\beta-8}^{\alpha} = -6 \right.$$

(۱۲۷) اگر در یک بیضی داشته باشیم $F'(-3,2), F(5,2), B(1,4)$ آنگاه خروج از مرکز بیضی را به دست آورید.

$$O = \frac{F+F'}{2} \Rightarrow O \left|_{\beta}^{\alpha} \right. \begin{matrix} \alpha = \frac{-3+5}{2} = 1 \\ \beta = \frac{2+2}{2} = 2 \end{matrix}, \quad \begin{cases} 2c = |FF'| = 5 - (-3) = 8 \Rightarrow c = 4 \\ B(\alpha, \beta+b) = (1, 4) \Rightarrow 1+4 = 5 \Rightarrow b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \sqrt{b^r + c^r} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \\ e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases}$$



معادله استاندارد دایره: معادله دایره ای به مرکز $O(\alpha, \beta)$ و شعاع R به صورت: $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$ است.

معادله فرم گستردگی دایره: اگر معادله فرم استاندارد دایره را بسط دهیم و مرتب بنویسیم فرم گستردگی معادله دایره را خواهیم داشت.

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$\begin{cases} a = -2\alpha \\ b = -2\beta \\ c = \alpha^2 + \beta^2 - R^2 \end{cases} \Rightarrow O \begin{cases} \alpha = \frac{-a}{2} \\ \beta = \frac{-b}{2} \end{cases}, \quad R = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - c}$$

۱) در فرم گستردگی باید ضرائب $a^2 + b^2 - 4c > 0$, $x^2 + y^2$ برابر باشند و همواره باید:

۲) برای نوشتن معادله دایره داشتن مختصات مرکز و شعاع دایره الزامی است مگر آنکه در مسئله اطلاعاتی بدنهند که بتوان آنها را محاسبه کرد.

۳) در نوشتن و حل مسائل دایره از رسم کردن غافل نشوید به خصوص هنگامی که ایده خاصی ندارید و چیزی به ذهنتان نمی‌رسد پیاده کردن داده‌های مسئله روی شکل راه حل را به ذهن ما القاء می‌کند.

۴) در بعضی از سوالات میگه مرکز دایره روی خط $y = mx + n$ قرار داره ویا میگه $y = mx + n$ معادله یک قطر دایره است. در این سوالات مرکز را به صورت $O \begin{cases} \alpha \\ \beta = ma + n \end{cases}$ نشان دهید.


۱۲۸) معادله دایره ای را بنویسید که نقاط $B(-2, 2)$, $A(2, 4)$ دو سر یک قطر آن باشند.

$$O = \frac{A+B}{2} \Rightarrow O \begin{cases} \alpha = \frac{-2+2}{2} = 0 \\ \beta = \frac{2+4}{2} = 3 \end{cases} \Rightarrow R = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2} \sqrt{(2+2)^2 + (4-2)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{20} = \sqrt{5}$$



$$(x - 0)^2 + (y - 3)^2 = 5$$

۱۲۹) اگر بدانیم خط L در نقطه $(-3, 4)$ بر دایره ای به مرکز مبداء مختصات مماس است. معادله خط مماس را بنویسید.




$$M_{OA} = \frac{4}{-3} \Rightarrow M' = \frac{3}{4} \Rightarrow L_A : y - 4 = \frac{3}{4}(x + 3)$$

۱۳۰) دایره ای به مرکز $O(1, -1)$ خط $\frac{3}{2}x - 2y + 4 = 0$ را در دو نقطه قطع می‌کند و طول وتر ایجاد شده ۸ است معادله این دایره را بنویسید.

خطی که از مرکز دایره بر وتر وارد و بر آن عمود باشد آن را نصف می‌کند.

$$OH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\left|\frac{3}{2} + 2 + 4\right|}{\sqrt{\frac{9}{4} + 4}} = \frac{7/5}{\frac{5}{2}} \Rightarrow OH = \frac{14}{5} = 2.8$$

$$R^2 = OH^2 + (\frac{r}{2})^2 = 2.8^2 + 4^2 = 25 \Rightarrow R = 5 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 25$$





۱- مختصات مرکز دو دایره و همچنین شعاع هریک را به تعیین کنید.

۲- فاصله دو مرکز دایره یعنی $d = |O_1 O_2|$ را حساب کنید.

۳- $|R_1 - R_2|$ را محاسبه کنید.

۴- $|R_1 + R_2|$ را با d مقایسه کنید.

$d > R_1 + R_2$	مُنْخَارِج	
$d = R_1 + R_2$	مُمَاسٌ مُخَارِج	
$ R_1 - R_2 < d < R_1 + R_2$	مُتَقَاطِع	
$d = R_1 - R_2 $	مُمَاسٌ دَاخِل	
$d < R_1 - R_2 $	مُتَدَاخِل	
$d = 0$	هم مرکز	

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x + 8y + 16 = 0 \\ x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{دو دایره به معادلات:}$$

نسبت به هم چگونه است؟


$$1) \quad O_1(2, -4), \quad R_1 = \frac{1}{2}\sqrt{16+64-76} = 1$$

$$2) \quad O_2(2, -2), \quad R_2 = \frac{1}{2}\sqrt{16+16+4} = 3, \quad \begin{cases} R_1 + R_2 = 4 \\ |R_1 - R_2| = 2 \end{cases} \Rightarrow d = |R_1 - R_2| = 2 \quad \text{مماس داخل است}$$

$$3) \quad d = |O_1 O_2| = \sqrt{(2-2)^2 + (-2+4)^2} = 2$$

(۱۳۲) وضعیت خط به معادله $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ نسبت به دایره $3x + 4y + 7 = 0$ چگونه است.

$$O_1(1, 0), \quad R_1 = \frac{1}{2}\sqrt{4+12} = 2, \quad OH = \frac{|3+7|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2 \Rightarrow OH = R \quad \text{خط و دایره بر هم مماس است}$$




(۱۳۳) وضعیت دو دایره $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ نسبت به هم را تعیین کنید.

$$O_1(1, 1), \quad R_1 = 2, \quad O_2(4, 1), \quad R_2 = \frac{1}{2}\sqrt{4+64-52} = \frac{1}{2}\sqrt{16} = 2$$

$$d = |O_1 O_2| = |4-1| = 3, \quad R_1 + R_2 = 2+2=4, \quad |R_1 - R_2| = 0, \quad |R_1 - R_2| < O_1 O_2 = d < R_1 + R_2$$

دو دایره متقطع است.


فصل ۷ احتمال
یاد آوری

(۱۳۴) در جعبه‌ای ۶ لامپ سالم و ۴ لامپ معیوب وجود دارد. ۳ لامپ به تصادف و هم زمان خارج می‌کنیم، احتمال آن که لامپ‌ها از یک نوع باشند را بباید.

پاسخ:

$$n(S) = \binom{10}{3} = 120$$

$$n(A) = \binom{4}{3} \binom{6}{0} + \binom{6}{3} \binom{4}{0} = 4 + 20 = 24 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$$

(۱۳۵) دو مهره متواالیاً بدون جایگذاری خارج می‌کنیم احتمال آن که یکی سفید و دیگری قرمز باشد چقدر است؟

پاسخ:

پونگفته متواالی و برونو پاپلزاری از روش ضرب تنااسب‌ها میریم.

$$P(D) = \frac{3}{14} \times \frac{5}{13} + \frac{5}{14} \times \frac{3}{13}$$

اولی قرمز دومی سفید

(۱۳۶) احتمال قبولی کنکور نفر اول $\frac{2}{5}$ و احتمال قبولی نفر دوم $\frac{3}{7}$ است.

الف) احتمال اینکه فقط نفر دوم در کنکور قبول شود.

ب) احتمال اینکه هیچ‌کدام قبول نشوند را بدست آورید.

پاسخ:

قبولی نفر اول ربطی به قبولی نفر دوم ندارد یعنی مستقل‌اند، هم‌چنین متمم این پیشامدها نیز مستقل‌اند

$$P(A') = P(A') \times P(B) = (1 - \frac{2}{5}) \times \frac{3}{7} = \frac{9}{35}$$

$$P(B') = P(A' \cap B') = P(A') \times P(B') = (1 - \frac{3}{7})(1 - \frac{2}{5}) = \frac{12}{35}$$

(۱۳۷) احتمال آن که شخص A تا ۲۰ سال دیگر ناراحتی قلبی بپیدا کند $6/0$ است، چقدر احتمال دارد:

الف) هر دو تا ۲۰ سال دیگر ناراحتی قلبی بپیدا کند.

ب) حداقل یکی از آنها تا ۲۰ سال دیگر ناراحتی قلبی بپیدا کند.

پاسخ:

بیماری شخص A ربطی به بیماری شخص B ندارد یعنی از هم مستقل‌اند. هر دوی آن‌ها بعد از ۲۰ سال ناراحتی قلبی بگیرند یعنی اشتراک، حداقل یکی از آن‌ها ناراحتی بگیرد یعنی اجتماع.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{48}{100}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B) = \frac{1}{10} + \frac{6}{10} - (\frac{1}{10} \times \frac{6}{10}) = \frac{92}{100}$$

فرمول احتمال کل یا قانون جمع احتمال ها

اگر فضای نمونه ای S به پیشامدهای A_1, A_2, \dots, A_n افراز شده باشد . یعنی :

$$A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S$$




قانون جمع احتمال ها

در بعضی از مسایل احتمال، فضای نمونه ای به چند قسمت تقسیم می شوند. مثل مردان و زنان - ظرفها و کيسهها و ...

فرض کنید A_1, A_2, \dots, A_n پیشامدهایی از فضای نمونه ای S باشند به طوری که $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ و این پیشامدها دو به دو ناسازگار باشند یعنی اشتراك نداشته باشند. و اگر X یک پیشامد دلخواه از S باشد در این صورت داریم از قانون جمع احتمال استفاده می شود. البته هنگامی که پیشامدی مانند X با چندین پیشامد دیگر مانند: A_1, A_2, \dots, A_n (که فضای نمونه را افراز نموده اند) اشتراك داشته باشد.

$$P(X) = p(A_1)p(x|A_1) + p(A_2)p(x|A_2) + \dots + p(A_n)p(x|A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(X|A_i)$$



اگر فضای نمونه ای پند قسمتی باشد ، مثل زنان و مردان ، ظرفها و کيسهها مختلف ، شهری و روستایی و کارگاههای مختلف ، هالت های متفاوت و احتمال یه پیشامد مثل X در این فضای بفواهد از فرمول بالا به دست استفاده می کنیم

برای حل این مسایل می توانیم از نمودار درختی استفاده کنیم به طوری که اعداد موجود در هر شاخه از درخت را در هم ضرب نموده و اگر از شاخه ای به شاخه دیگر برویم اعداد آنها را با هم جمع می کنیم.

۱۳۸) درصد جمعیت کشوری را مردان که ۷۰ درصد آن ها با سوادند و بقیه جمعیت زنان ، با ۶۰ درصد سواد می باشند ، چند درصد این جمعیت باسواد هستند ؟

پاسخ:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$


$$P(B) = \frac{60}{100} \times \frac{70}{100} + \frac{40}{100} \times \frac{60}{100} = \frac{66}{100}$$

۱۳۹) طبق تحقیقات پژوهشی احتمال تولد غیر طبیعی برای پسر $\frac{18}{100}$ و برای دختر $\frac{21}{100}$ است احتمال این که فرزند یک خانواده غیر طبیعی به دنیا بیاید چقدر است ؟

پاسخ: اگر A پیشامد غیر طبیعی به دنیا آمدن فرزند ، A_1 پیشامد پسر بودن و A_2 پیشامد دختر بودن باشد ، داریم :


$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{21}{100} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{100} = \frac{39}{200}$$

۱۴۰) ۵۲٪ جمعیت کشور را زنان و ۴۸٪ دیگر را مردان تشکیل می‌دهند اگر ۶۰٪ زنان و ۶۸٪ از مردان با سواد باشند چند درصد از افراد جامعه باسوادند؟
پاسخ:




$$P = \frac{48}{100} \times \frac{68}{100} + \frac{52}{100} \times \frac{60}{100}$$

۱۴۱) در جعبه A، ۵ مهره سفید و ۳ مهره قرمز و در جعبه B، ۳ مهره سفید و ۴ مهره قرمز وجود دارد. یکی از این دو جعبه را به تصادف انتخاب و از آن یک مهره خارج می‌کنیم چقدر احتمال دارد این مهره سفید باشد؟
پاسخ:




$$P(\text{سفید بود}) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$$

۱۴۲) در اداره‌ای ۶۰٪ کارمندان مرد، و ۲۲٪ آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند. ۲۸٪ زنان این اداره نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. اگر یک نفر از میان آن‌ها انتخاب شود چقدر احتمال دارد تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد؟
پاسخ:



$$P = \frac{6}{10} \times \frac{78}{100} + \frac{4}{10} \times \frac{72}{100}$$

۱۴۳) انتقال نوعی بیماری ارثی از پدر مادر به فرزند پسر ۱۵٪ و به فرزند دختر ۲۰٪ است. والدینی که حامل این نوع بیماری اند انتظار فرزندی را دارند. احتمال آن که این فرزند سالم به دنیا بیاید را حساب کنید.
پاسخ:



$$P(\text{فرزند سالم}) = \frac{1}{2} \times \frac{85}{100} + \frac{1}{2} \times \frac{80}{100}$$

۱۴۴) در جعبه A، ۲ مهره سفید ۳ مهره سیاه و در جعبه B، ۳ مهره سفید و ۴ مهره سیاه قرار دارد. از هر یک از این دو جعبه ۱ مهره خارج می‌کنیم. احتمال اینکه دو مهره هم رنگ باشند کدام است؟
پاسخ:

$$P(\text{دو سیاه}) + P(\text{دو سفید}) = P(\text{دو هم رنگ})$$

$$P = \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{18}{35}$$



هر وقت در انتخاب‌های متواالی یکی از انتخاب‌ها مورد برسش قرار نگیره یعنی از نتیجه‌ی یک آزمایش چیزی نگویند ما باید خودمون حالت‌های ممکن رو برای اون در نظر بگیریم یا این‌که فکر کنیم اصلاً اون آزمایش رخ نداده و احتمال موارد گفته شده رو حساب کنیم.

۱۴۵) در آزمایشگاهی ۵ موش سفید و ۳ موش سیاه نگهداری می‌شود با تصادف سه موش از بین آن‌ها انتخاب می‌شود . با کدام احتمال ، اولین موش سفید و سومین موش سیاه است؟
(سراسری تجربی ۸۸)

پاسخ:

$$P_1 = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} ; \text{(راه اول)}$$

پون از رنگ موش دو^۳ هرفی نزدیکی یا هالت‌های ممکن برای اون رو حساب می‌کنیم مثل راه مل اول و یا مثل راه مل دو^۳ انگار اتفاقی نیفتاده . احتمال‌های اول و سوم را حساب می‌کنیم و در هم ضرب می‌کنیم .

$$P_2 = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56} ; \text{(راه دو^۳)}$$

۱۴۶) در جعبه‌ای ۶ مهره سفید و ۹ مهره سیاه موجود است. دو مهره متواالیاً بدون جایگذاری از آن بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال بدون توجه به اولین مهره دومین مهره خارج شده سفید است?
(سراسری تجربی ۹۲)

پاسخ:

$$P(A) = \frac{6}{15} \times \frac{5}{14} + \frac{9}{15} \times \frac{6}{14} = \frac{84}{15 \times 14} = \frac{2}{5}$$

بدون در نظر گرفتن مهره اول فقط احتمال سفید بودن مهره دو^۳ را حساب می‌کنیم. میبینی که بواب یکیه .

۱۴۷) دو مهره متواالیاً بدون جایگذاری خارج می‌کنیم احتمال ان که یکی سفید و دیگری قرمز باشد چقدر است؟

پاسخ:

پون گفته متواالی و بدون بایگزاری از روش ضرب تنااسب‌ها میریم .

$$P(D) = \frac{3}{14} \times \frac{5}{13} + \frac{5}{14} \times \frac{3}{13} ; \quad \begin{array}{l} \text{اولی سفید دومی قرمز} \\ \text{اولی قرمز دومی سفید} \end{array}$$

۱۴۸) در کیسه‌ای ۶ مهره آبی و ۴ مهره قرمز وجود دارد اگر در سه اقدام به برداشتن مهره از کیسه کنیم به طوریکه در مرحله اول ۲ مهره در مرحله دوم ۳ مهره و در مرحله سوم ۵ مهره برداریم با کدام احتمال همه مهره‌های قرمز در مرحله سوم از کیسه خارج می‌شوند?
(پاسخ:)

$$P = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} \times \frac{\binom{4}{3}}{\binom{8}{3}} \times \frac{\binom{4}{1} \binom{1}{1}}{\binom{5}{5}} = \frac{15}{45} \times \frac{4}{56} \times 1 = \frac{1}{42}$$

در مرحله اول هر سه سفید بیار

در مرحله سوم چهار تا قرمز و یک مهره سفید بیار

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲	رشته: تجربی	سوالات امتحان درس: ریاضی ۳ سال دوازدهم
ساعت شروع:	تاریخ امتحان:	دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:


آزمون اول : مطابق با امتحانات ترم اول

دانش آموزان سراسر کشور

@kimia-mahan

سوالات


ردیف	نمره	سوالات
۱	۱/۲۵	نمودار تابع زیر رارسم، سپس بازه‌هایی را که در آن تابع صعودی اکید، نزولی اکید یا ثابت است را مشخص کنید. $f(x) = \begin{cases} -x^3 & x < 0 \\ -1 & 0 \leq x \leq 1 \\ -3x+1 & x > 1 \end{cases}$
۲	۱	تابع $g(x) = 2x$ مفروض‌اند. دامنه و ضابطه‌ی تابع (x) fog را محاسبه کنید.
۳	۲/۵	تابع $f(x) = -(x+1)^3$ را در نظر بگیرید و موارد زیر را کاملاً توضیح داده و انجام دهید. الف) نمودار $f(x) = y$ را به کمک x^3 رسم کنید. مراحل را توضیح دهید. ب) نشان دهید $f(x)$ وارون پذیر است و ضابطه‌ی $f^{-1}(x)$ را به دست آورید.
۴	۱	اگر $g = \{(1,5), (0,0), (-2,1), (3,3)\}$ ، $f = \{(1,2), (3,4), (9,1)\}$ آنگاه: ب) دامنه fog را به دست آورید. الف) تابع fog را تعیین کنید.
۵	۱/۵	دامنه تابع $y = \tan \frac{x}{2}$ را تعیین کنید و نمودار آن را در بازه $[-\pi, \pi]$ رسم کنید.
۶	۱/۵	با دقت در نمودار داده شده تابع مربوط با ضابطه $f(x) = a \cos bx + c$ یا $f(x) = a \sin bx + c$ می‌باشد. با تشخیص مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوی ضابطه‌ی آن را تعیین کنید.
۷	۱/۵	جواب‌های عمومی معادله مثلثاتی $\sin x - \cos 2x = 0$ را تعیین کنید.
۸	۱	$\cos 15^\circ$ را تعیین کنید.
۹	۱	با استفاده از شکل حدۀای زیر را در صورت وجود به دست آورید. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$
۱۰	۲	حدود زیر را تعیین کنید. ۱) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 - x}{4x^2 - 1}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x$ ۳) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x-1}}{x^2 - x}$ ۴) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 2}{x^2 + 5x + 1}$
۱۱	۰/۷۵	درستی و نادرستی موارد زیر را تعیین کنید. الف) تابع $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ همواره تابعی صعودی است. ب) تابع $y = \log_{0/4} x$ همواره تابعی نزولی است. پ) در تابع $f(kx)$ اگر $1 < k < 0$ باشد می‌گوییم نمودار تابع (x) انبساط افقی یافته است.

۱/۵	معادله خط مماس بر منحنی $f(x) = -x^2 + 10$ را در نقطه $A\left(\frac{2}{f(2)}\right)$ واقع بر نمودار آن را بنویسید.	۱۲
۱/۵	برای تابع $f(x)$ در شکل زیر داریم: $f'(3) = \frac{\Delta}{3}$. با توجه به شکل مختصات A و B و C را بیابید.	۱۳
۱	 <p>جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) تابع $f(x) = \log_{\frac{1}{5}} 2^x$ صعودی</p> <p>ب) مجموعه $\{x \mid x = \frac{5}{3}\}$ یک نقطه $x = 3$ می باشد.</p> <p>ج) برای رسم تابع $f(kx)$ کافی است طول نقاط نمودار تابع $f(x)$ را در ضرب کنیم.</p> <p>د) در بازه $\pi < \alpha < \frac{\pi}{2}$ نامساوی $\tan \alpha > \sin \alpha$ است.</p>	۱۴
۱	<p>(۱) اگر $\cos x = \frac{5}{13}$ باشد، $\cos 2x$ کدام است؟</p> <p>(۲) حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \frac{1}{x^2}}{1 - 6x}$ کدام است؟</p> <p>(۳) کدام تابع زیر اکیدانزولی است؟</p> <p>$f(x) = \sqrt{-x}$ (۴) $f(x) = x + x$ (۳) $f(x) = x x$ (۲) $f(x) = x$ (۱)</p> <p>(۴) در تابع $f\left(\frac{-1}{2}f(\sqrt{3})\right)$ کدام است؟</p> <p>$f(x) = x^2 - 2[x]$ حاصل</p> <p>(۱) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{7}{4}$ (۳) $\frac{-7}{4}$ (۲) $\frac{9}{4}$ (۱)</p>	۱۵
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

ردیف	پاسخ نامه تشریحی آزمون اول	نمره									
۱	<p>در بازه $(-\infty, 0)$ صعودیه . در بازه $[0, 1]$ ثابت و در بازه $(1, +\infty)$ نزولیه .</p>										
۲	$D_f = \left\{ x \mid \frac{3x-2}{1-x} \geq 0 \right\} = \left[\frac{2}{3}, 1 \right)$, $D_g = \mathbb{R}$ $D_{fog} = \left\{ x \in Dg \mid g(x) \in D_f \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{3} \leq 2x < 1 \right\} = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$ <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$\frac{2}{3}$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$\frac{3x-2}{1-x}$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>ن</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{3x-2}{1-x}$	-	0	+	ن	-	
x	$\frac{2}{3}$	1									
$\frac{3x-2}{1-x}$	-	0	+	ن	-						
۳	<p>انتقال ۱ واحدی نمودار در امتداد محور $y = x^r$ به سمت راست</p> <p>قرینه نسبت به محور x ها</p> <p>$y = -(x+1)^r + 1$</p>										
۴	$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow -(x_1+1)^r + 1 = -(x_2+1)^r + 1 \rightarrow (x_1+1)^r = (x_2+1)^r \Rightarrow x_1+1 = x_2+1$ $x_1 = x_2$ $y = -(x+1)^r + 1 \rightarrow (x+1)^r = (1-y) \rightarrow x+1 = \sqrt[r]{1-y} \rightarrow x = \sqrt[r]{1-y} - 1 \rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[r]{1-x} - 1$ <p>الف</p> $\begin{cases} 1 \xrightarrow{g} 5 \xrightarrow{f} x \\ 0 \xrightarrow{g} 0 \xrightarrow{f} 1 \\ -2 \xrightarrow{g} 1 \xrightarrow{f} 2 \\ 3 \xrightarrow{g} 3 \xrightarrow{f} 4 \end{cases} \Rightarrow fog = \{(0, 1), (-2, 2), (3, 4)\}$ <p>ب)</p> $\begin{cases} 1 \xrightarrow{f} 2 \xrightarrow{g} x \\ 3 \xrightarrow{f} 4 \xrightarrow{g} x \\ 0 \xrightarrow{f} 1 \xrightarrow{g} 5 \end{cases} \Rightarrow D_{gof} = \{0\}$										
۵	$y = \tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}$, $\cos \frac{x}{2} = 0 = \cos \pi k \pm \frac{\pi}{2}$, $x = \pi k \pm \pi$ $D_f = \mathbb{R} - (\pi k \pm \pi)$ <p>تابع $\tan \frac{x}{2}$ یک تابع کسریه باید ریشه های مخرج اونو حساب کنیم</p>										
۶	<p>با توجه به شکل ، نمودار تابع به خرمکسینوس است .</p> $f(x) = a \cos bx + c \Rightarrow \max = a , \min = c , T = \frac{2\pi}{ b }$ $ a = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} = \frac{a - c}{2} = 2 , c = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} = 3 , b = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 2 , b = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow y = 2 \cos\left(\pm \frac{x}{2}\right) + 3$										
۷	$\cos 2x = \sin x \Rightarrow 1 - 2 \sin^2 x - \sin x = -2 \sin x - \sin x + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \Rightarrow x = \pi k - \frac{\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pi k + \frac{\pi}{6} , x = \pi k + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$										

	$\begin{cases} \cos 1\Delta = \cos x \\ \cos 3\circ = \cos 3x \end{cases} \Rightarrow 1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x \Rightarrow 2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ $\cos x = \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{2}} \Rightarrow \cos 1\Delta = \sqrt{\frac{1 + (\frac{\sqrt{3}}{2})}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}}$	۸
	$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 4 + 2 = 6$	۹
	$1) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{rx^r - x}{rx^r - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x(\cancel{(rx-1)})}{\cancel{(rx-1)}(rx+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan 2x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$ $3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{rx-1}}{x^r - x} \times \frac{x + \sqrt{rx-1}}{x + \sqrt{rx-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - rx + 1 = (x-1)^r = (x-1)}{x(\cancel{x-1})(x + \sqrt{rx-1})} = 0$ $4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{rx^r - rx + 2}{x^r + rx + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{rx^r}{x^r} = 2$	۱۰
	ج) درست	ب) درست
	الف) نادرست	۱۱
	$A \left \begin{array}{l} r \\ f(2) = 16 \end{array} \right. \Rightarrow f'(x) = -rx + 10 \rightarrow f'(2) = 6 \Rightarrow y - 16 = 6(x - 2)$	۱۲
	$M(L_{CAB}) = f'(2) = \frac{5}{3} \Rightarrow y - 15 = \frac{5}{3}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{5}{3}x + 10$ $y_C = \frac{5}{3}(2) + 10 = \frac{40}{3}, \quad y_B = \frac{5}{3}(4) + 10 = \frac{50}{3}$ $A \left \begin{array}{l} 3 \\ 15 \end{array} \right. \quad B \left \begin{array}{l} 4 \\ 50/3 \end{array} \right. \quad C \left \begin{array}{l} 2 \\ 40/3 \end{array} \right.$	۱۳
	د) نادرست	الف) نیست
	۱) $\frac{1}{k}$ (ج)	ب) همسایگی محدود
	۲) گزینه ۲	۳) گزینه ۳
	۴) گزینه ۴	۵) گزینه ۵
	$1) \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 2 \left(\frac{5}{13} \right)^2 - 1 = \frac{50}{169} - 1 = \frac{-119}{169}$ $2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{x^r}}{\frac{1 - \frac{1}{x^r}}{x}} = \frac{3 - \frac{1}{\infty}}{\frac{1 - \frac{1}{\infty}}{0 - \frac{1}{\infty}}} = \frac{3 - 0}{0 - 0} = \frac{-1}{2}$ $3) f(x) = \sqrt{-x}$ $f(x) = x^r - 2[x] \Rightarrow f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^r - 2[\sqrt{3}] = 3 - 2 = 1$ $f\left(\frac{-1}{2}f(\sqrt{3})\right) = f\left(\frac{-1}{2}(1)\right) = \left(\frac{-1}{2}\right)^r - 2\left[\frac{-1}{2}\right] = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$	۱۵
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

نمره	سوالات	ردیف
۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید ؟ الف) تابع $f(x) = -x^3 + 3x$ روی بازه $[-\infty, 3]$ اکیداً صعودی است . ب) تابع $y = x^3 - 1$ روی بازه $[0, 1]$ بالاتر از تابع $y = x^3$ قرار دارد . ج) باقیمانده تقریبی $f(x) = 2x^5 - 2x^3 + 4$ بر $x+1$ برابر صفر است . د) تابع $\tan x$ در هر بازه ای که در آن تعریف شده باشد صعودی است .	۱
۱	اگر نقطه‌ای روی نمودار تابع $y = f(x-2)+1$ باشد، نقطه‌ی A' نظیر آن روی تابع $g(x) = 3f(x-2)$ می‌باشد. مختصات A' را به دست آورید.	۲
۱/۵	الف) تابع f در \mathbb{R} نزولی است و $f(3x-1) < f(2-x)$ حدود x را تعیین کنید . ب) حدود m را طوری تعیین کنید که تابع $y = f(x) = (m-6)x^3 - 2x + \infty$ در بازه $(-\infty, 2)$ صعودی باشد .	۳
۱/۵	اگر ورودی $f(x) = \sqrt{x}$ باشد، خروجی ماشین زیر را تعیین کنید . در هر مرحله شکل مربوطه رارسم کنید .	۴
۱	تابع $g(x) = \frac{x-7}{x-2}$ مفروضند . بدون تشکیل ضابطه دامنه تعریف fog را به دست آورید .	۵
۱	در تقسیم $3x^3 - 5x + 2$ بر عبارت $(x-2)$ مراحل زیر را تکمیل کنید آیا $f(x) = x^2 - 5x + 2$ بر $(x-2)$ بخش پذیر است ؟ چرا ؟ $\begin{array}{r} 3x^3 - 5x + 2 \\ \underline{- (3x^3 - 6x)} \\ \hline x + 2 \\ - (x - 2) \\ \hline R = \end{array}$	۶
۱	اگر $f(x) = x^3 - 3x + 4$ و $g(x) = ax^2 + bx + c$ باشد، a, b, c را طوری تعیین کنید که داشته باشیم :	۷
۲	تابع $y = 1 - \sin \pi x$ را با پیدا کردن مقادیر ماکسیمم و مینیمم و دوره تناوب آن در یک دوره تناوب رسم کنید .	۸
۲	$1 + \cos 2x - 2 \sin x = -2$ جواب های کلی معادله مثلثاتی زیر را بدست آورید .	۹
۱/۵	اگر $\tan \frac{2\pi}{3} \times \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) = 1$ باشد، مقدار $\cos 2x$ را به دست آورید .	۱۰
۲	حاصل حدود زیر را به دست آورید .	۱۱
۱/۵	اگر تابع $f(x) = x^3 - ax$ در نقطه $x=2$ مماس باشد، مقدار a را بدست آورید .	۱۲
۱/۵	مشتق تابع $y = x^3 - 1 $ را در نقطه $x=1$ را با استفاده از تعریف مشتق به دست آورید .	۱۳
۱/۵	با توجه به شکل مقابل حاصل حدود زیر را به دست آورید .	۱۴






$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \\ &\lim_{x \rightarrow 0^-} [f(x)] \\ &\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \end{aligned}$$

ردیف	نمره	پاسخ نامه تشریحی آزمون دوم						
۱		<p>الف) نادرست چون راس سهمی $x = \frac{-b}{2a} = \frac{۳}{۲}$ و بعد اون تابع صعودیه</p> <p>ب) درست چون : $\text{if } x \in (0, 1) \Rightarrow x^3 < x^2$</p> <p>ج) نادرست چون : $f(-1) = ۷ \neq ۰$</p> <p>د) درست چون : در بازه ای که تعریف شده باشه و مجانب قائم نداشته باشه همیشه داریم : $x_1 < x_2 \Rightarrow \tan x_1 < \tan x_2$</p>						
۲		<p>طول نقطه داده شده را باید ۲ واحد به سمت راست ببریم : $x = -۵ \rightarrow x = -۵ + ۲ = -۳$ عرض نقطه را باید ۳ برابر کنیم و یک واحد بهش اضافه کنیم.</p> <p>در کل یعنی : $y = ۳(x+۳)+۱ = ۱۰$</p> <p>if $A(x, y) \in f(x)$</p> $A' \begin{cases} \frac{x_0 - b}{a} \\ ky_0 + k' \end{cases} \in g(x) = kf(ax+b) + k'$ <p>$A(-5, 2) \in f(x)$</p> $A' \begin{cases} \frac{-5 - (-2)}{1} = -3 \\ 3(2) + 1 = 10 \end{cases} \in g(x) = 3f(x-2) + 1$						
۳		<p>الف) گفته تابع f نزولیه پس باید :</p> <p>$f \searrow \Rightarrow \text{if } x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(3x-1) < f(2-x) \Rightarrow 2-x < 3x-1 \Rightarrow x > \frac{۳}{۴}$</p> <p>ب) برای اینکه تابع تو بازه $[2, +\infty]$ صعودی باشه باید :</p> <p>$f(x) = (m-6)x^2 - x \Rightarrow a = m-6 > 0 \quad [1] , \quad \frac{-b}{2a} = \frac{1}{2(m-6)} \leq 2 \quad [2] \Rightarrow m > 6 \cap m \geq \frac{25}{4} \Rightarrow m \geq \frac{25}{4}$</p>						
۴		<p>دو واهر میره به سمت راست.</p> <p>دو واهر کشیدگی عرضی داره.</p> <p>شکل نسبت به محور X ها قرینه میشه.</p> <p>-</p>						
۵		<p>$f = ۲\sqrt{x-۲} \Rightarrow x-۲ \geq ۰ \Rightarrow D_f = [۲, +\infty) \quad , \quad D_g = \mathbb{R} - \{2\}$</p> <p>$D_{fog} = \left\{ x \mid x \in D_g = \mathbb{R} - \{2\} \quad \exists \frac{x-۲}{x-2} \geq ۲ \Rightarrow \frac{-4x+۴}{x-2} \geq ۰ \right\} = \left[\frac{۴}{۴}, ۲ \right)$</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$\frac{۴}{۴}$</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>$\frac{-4x+۴}{x-2}$</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$\frac{۴}{۴}$	۲	$\frac{-4x+۴}{x-2}$	-	+
x	$\frac{۴}{۴}$	۲						
$\frac{-4x+۴}{x-2}$	-	+						
۶		$\begin{array}{r} ۴x^2 - ۸x + ۴ \\ -(4x^2 - 8x) \\ \hline ۰ \end{array}$ $\begin{array}{r} x+2 \\ -(x-2) \\ \hline R = \boxed{4} \end{array}$						
۷		<p>$f(g(x)) = ax^2 + bx + c + a = x^2 - ۳x + ۴ \Rightarrow \begin{cases} a = ۱ \\ b = -۳ \\ c + a = ۴ \Rightarrow c = ۳ \end{cases}$</p> <p>یعنی در تابع f هر جا X داریم به جاش ضابطه g رو میگذاریم</p>						

$$y = 1 - \sin \pi x = -\sin \pi x + 1 \Rightarrow a = -1, b = \pi, c = 1, T = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

$$-1 \leq \sin \pi x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -\sin \pi x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - \sin \pi x \leq 2$$



$$1 + \cos 2x - 2 \sin x = 2 \cos^2 x - 2 \sin x = 2(1 - \sin^2 x) - 2 \sin x = -2 \sin^2 x - 2 \sin x + 2 = -2 \Rightarrow 2 \sin^2 x + 2 \sin x - 4 = 0$$

$$\sin x = -2 \quad \text{قابل قبول نیست}, \quad \sin x = 1 = \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

چون مجموع ضرائب معادله صفره، یکی از جواب ها $\frac{c}{a}$ میشه و دیگری

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \sin(\frac{2\pi}{3} - x) = 1 \Rightarrow (-\sqrt{3})(-\cos x) = 1 \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 \Rightarrow \cos 2x = 2(\frac{\sqrt{3}}{3})^2 - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^r - 2x + 1}{x^r + \Delta x - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^r}{x^r} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = \frac{2}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{2x + 16} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt[3]{x} + 2)(\sqrt[3]{x}^2 - 2\sqrt[3]{x} + 4)}{2(x + 8)(\sqrt[3]{x}^2 - 2\sqrt[3]{x} + 4)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + 8)}{2(x + 8)(12)} = \frac{1}{24}$$

در نقطه‌ی تماس خط مماس بر منحنی تابع، عرض خط مماس و عرض تابع برابر است.

$$f(2) = 2^2 - a(2) = 2(2) - 1 = 5 \Rightarrow a = \frac{-1}{2}$$

یعنی باید در معادله تابع و خط مماس بهای $x = 2$ بگذاریم و مساوی هم قرار ببریم

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1| - 0}{x - 1} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = 2 = f'_+(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = -2 = f'_-(1) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} [f(x)] = [-1^-] = -2$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

۲۰ جمع بارم

موفق باشید

سوالات امتحان درس:	رشنده: تجربی	تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان:	ساعت شروع:
آزمون سوم مطابق با امتحانات نهایی خرداد ماه @ kimia – mahan			دانش آموزان در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸
سوالات			ردیف
۱	<p>جاهای خالی را پر کنید.</p> <p>الف) در تابع $f(x) = x^3 + ax^2 + x - 1$ داریم $f''(x) = 3$ باشد، مقدار a برابر است با</p> <p>ب) تابع $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ در دامنه خود صعودی</p> <p>ج) تابعی که فقط صعودی یا فقط نزولی باشد را تابع می‌گویند.</p> <p>د) برای رسم تابع $f(kx)$ کافی است طول نقاط نمودار تابع $f(x)$ را در ضرب می‌کنیم.</p>		
۱	<p>نمودار تابع $f(x)$ شکل مقابل است. نمودار تابع $-g(x) = f(2x)$ را با توجه به آن رسم کنید و دامنه و برد آن را تعیین نمایید.</p>		
۱	<p>اگر $g(x) = 2x^3 - 1$ آنگاه دامنه تابع gof را به دست آورید.</p>		
۱/۵	<p>معادله مثلثاتی: $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ حل کنید.</p>		
۲	<p>حدود زیر را تعیین کنید.</p> <p>۱) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 8x}{\sqrt[3]{x} - 2}$</p> <p>۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{\sqrt[3]{8x - 1}}$</p> <p>۳) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 3}{4 - x}$</p>		
۱/۵	<p>مشتق توابع زیر را به دست آورید (ساده کردن الزامی نیست)</p> <p>$f(x) = \sqrt{3x+2}(x^2 + 7)$</p> <p>$g(x) = \frac{9x-2}{\sqrt{x}}$</p> <p>$h(x) = \left(\frac{-3x-1}{x^2 + 5} \right)^3$</p>		
۲	<p>تابع $f(x) = \begin{cases} 5x - 4 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 3 \\ x + 6 & x > 3 \end{cases}$ مفروض است.</p> <p>الف) نمودار تابع را رسم کنید.</p> <p>ب) نمودار f' را رسم کنید.</p> <p>ج) ضابطه تابع مشتق را بنویسید.</p> <p>د) نشان دهید تابع در $x=3$ مشتق ناپذیر است.</p>		
۰/۷۵	<p>با توجه به شکل تابع $f(x)$ و نقاط روی آن به سوالات زیر پاسخ دهید .</p> <p>الف) طول نقاط اکسترمم نسبی تابع اند .</p> <p>ب) طول نقاطی که ماکسیمم مطلق تابع است .</p> <p>پ) طول نقاطی که تابع بحرانی است ولی اکسترمم نسبی نیست .</p>		
۱/۵	<p>در تابع $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ ابتدا نقاط بحرانی تابع را بدست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط ماکزیمم نسبی و منیمیم نسبی آن را در صورت وجود بدست آورید .</p>		
۱/۵	<p>مقدار ماکسیمم و منیمیم مطلق تابع با ضابطه $y = \frac{x^2}{16} + \frac{1}{x}$ در بازه $[1, 4]$ را به دست آورید .</p>		
۱	<p>حاصل ضرب دو عدد مثبت برابر ۸ است. کم ترین مقدار ممکن برای مجموع آن ها را محاسبه کنید .</p>		
۱	<p>قانون های یک بیضی $F(1, 3), F'(1, -5)$ باشد مختصات مرکز و مقادیر قطر کوچک و خروج از مرکز بیضی را به دست آورید .</p>		



۱	$\frac{3}{2}x - 2y + 4 = 0$ و بر خط $x^r + y^r - 4y + b = 0$, $x^r + y^r + 2x - 2y = 0$ مماس باشد.	۱۳
۱	به ازای کدام مقدار b دو دایره به معادلات $x^r + y^r - 4y + b = 0$, $x^r + y^r + 2x - 2y = 0$ مماس داخل اند؟	۱۴
۱	تاسی را پرتاب میکنیم اگر بدانیم عدد آمده بزرگتر از ۳ است . احتمال آن که عدد آمده اول باشد کدام است .	۱۵
۱/۵	دو جعبه یکسان داریم جعبه اول شامل ۷ مهره سبز و ۵ مهره آبی و جعبه دوم شامل ۶ مهره سبز و ۸ مهره آبی است از جعبه اول به تصادف یک مهره انتخاب می کنیم و در جعبه دوم قرار می دهیم سپس از جعبه دوم یک مهر بر می داریم به چه احتمالی این مهره سبز است؟	۱۶
۱	جا های خالی را با عبارات مناسب پر کنید . ۱ - شکل حاصل از دوران یک ربع دایره حول شعاع عمود بر قطر آن یک است . ۲ - شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضلاع قائمه است .	۱۷
۲۰	جمع موفق باشید	بارم

ردیف	پاسخ نامه تشریحی آزمون سوم	نمره
۱	$f' = 3x^r + 2ax + 1 \Rightarrow f'' = 6x + 2a \Big _{x=2} = 3 \Rightarrow a = -\frac{9}{2}$ الف) ب) نیست . بلکه نزولی اکید است : چون پایه لگاریتم : $a = 0 / 4 < 1$ ج) یکنوا $\frac{1}{k}$	
۲	 چون ضریب x ، 2 است تمام x های روی شکل را در $\frac{1}{2}$ ضرب می کنیم شکل منطبق میشه ولی بروش تغییر نمیکنه حالا کل شکل رو 1 واحد میاري پايين	
۳	$D_f = [1, +\infty)$, $D_g = \mathbb{R}$ $D_{gof} = \{x x \in D_f, f(x) \in D_g\} = \{x x \in [1, +\infty), \sqrt{x-1} \in \mathbb{R}\} = [1, +\infty)$	
۴	چون مجموع ضرائب معادله صفره ، یکی از جواب ها 1 میشه و دیگری $\frac{c}{a}$ $2\sin^r x - 3\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \sin x = 1 = \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \sin x = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$	
۵	$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^r - 8x}{\sqrt[3]{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-\lambda)(\sqrt[3]{x^r} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{(x-\lambda)(\sqrt[3]{x^r} + 2\sqrt[3]{x} + 4)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-\lambda)(\sqrt[3]{x^r} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{(x-\lambda)} = \frac{96}{1}$ $2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{\sqrt[3]{8x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{8x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{2}$ $3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^r} + x - 3}{4-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^r}}{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x = +\infty$	

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+2}}(x^r + 4) + (rx^r)\sqrt{3x+2}$$

$$g'(x) = \frac{9\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}(9x-2)}{(\sqrt{x})^r}$$

$$h'(x) = r\left(\frac{-rx-4}{x^r+4}\right)^r \left(\frac{-r(x^r+4) - (rx)(-rx-4)}{(x^r+4)^r} \right)$$



$$f(x) = \begin{cases} 5x - 4 & x < 0 \\ x^r & 0 \leq x \leq 1 \\ x + 4 & x > 1 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = f(x) = \begin{cases} 5 & x < 0 \\ rx & 0 < x < 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

تابع در $x=0$ تاپیوسته و در نقطه مشتق تاپزیر است و در نقطه $x=1$ زاویه دار است بطوریکه:
 $f'_-(1) = 5$ و $f'_+(1) = 1$ در نقطه $x=1$ مشتق تاپزیر است.

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

$$f(x) = -x^r + 3x + 2 \Rightarrow f'(x) = -rx^r + 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \quad \text{نقاط بحرانی}$$

x		-1	1
$f'(x)$	- ↘	+	↗

- طول ماقسیم نسبی 1 طول ماقسیم نسبی

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\}, \quad f'(x) = \frac{x}{r} - \frac{1}{x^r} = 0 \Rightarrow f' = \frac{x^r - 1}{rx^r} = 0 \Rightarrow x = +1 \quad \text{نقطه بحرانی}$$

x	1	2	4
$f(x)$	$\frac{17}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{4}$

ماکسیم مطلق مینیم مطلق

$$x, y > 0 \Rightarrow xy = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{x}, \quad f = x + y \Rightarrow f = x + \frac{1}{x} \Rightarrow f' = 1 - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\frac{x^r - 1}{x^r} = 0 \Rightarrow x^r - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt[2]{2} \Rightarrow f_{\min} = f(\sqrt[2]{2}) = 2\sqrt[2]{2} + \frac{1}{2\sqrt[2]{2}}$$

بیضیمون قائم است چون طول های F' , F ثابتند و داریم:

$$O = \frac{F+F'}{2} = \begin{cases} \alpha = \frac{1+1}{2} = 1 \\ \beta = \frac{3-1}{2} = -1 \end{cases}, \quad FF' = 2c = \sqrt{(1-1)^2 + (3-1)^2} = 2 \Rightarrow c = 1$$

$$b = \sqrt{a^r - b^r} = \sqrt{36-16} = 2\sqrt{5} \Rightarrow BB' = 2b = 4\sqrt{5}, \quad e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

	$R = \frac{\left \frac{3}{2}(1) - 2(-1) + 4 \right }{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (2)^2}} = 3 \Rightarrow (x-1)^2 + (y+1)^2 = 9$ <p style="text-align: center;">اول شعاع رو مساب می کنیم که همون فاصله مرکز از نقطه مماسه</p>	۱۳
	$o_1 \begin{cases} -1 \\ 1 \end{cases}, R_1 = \frac{1}{2} \sqrt{4+4} = \sqrt{2}, o_2 \begin{cases} 0 \\ 2 \end{cases}, R_2 = \frac{1}{2} \sqrt{16-4b} = \sqrt{4-b}, d = \sqrt{(-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}, R_2 - R_1 = d$ $ \sqrt{4-b} - \sqrt{2} = \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{4-b} = 2\sqrt{2} \Rightarrow 4-b=8 \Rightarrow b=-4$ <p style="text-align: right;">برای مماس داخل بودن باید</p>	۱۴
	<p>در پرتاب یک تاس خفای نمونه ای $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ است می دانیم عدد بر زمین نشسته بزرگ تر از ۳ رخ داده آنرا پیشامد عدد بر زمین نشسته اول است، اما A بنامیم و پیشامدی که رخ داده را B در نظر بگیریم، احتمال شرطی A به شرط وقوع B برابر است با :</p> $B = \{4, 5, 6\}, A = \{2, 3, 5\}, A \cap B = \{5\} \Rightarrow P(A B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{1}{3}$	۱۵
	<p>پاسخ مهره انتقال شده از همین اول یا سبز است با احتمال $p(b) = \frac{5}{12}$ و یا آبی با احتمال $p(g) = \frac{7}{12}$ از طرفی پیشامد انتقال مهره سبز از همین دو می باشد برای نشان دهنده این صورت احتمال آن که مهره قارچ شده سبز باشد برابر است با :</p> $p(A) = p(g)p(A g) + p(b)p(A b) = \frac{7}{12} \times \frac{7}{15} + \frac{5}{12} \times \frac{5}{15}$	۱۶
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

۲) مفروض


۱) نیعم کرد

۱۷

سوالات امتحان درس:	نام و نام خانوادگی:
ساعت شروع:	تاریخ امتحان:
@kimia-mahan آزمون چهارم:	دانش آموزان سراسر کشور در نوبت خود امتحان ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	سوالات	نمره
۱	در جای خالی عبارات مناسب قرار دهید . الف) وارون تابع: $f(x) = (x-1)^2$, $x \leq 1$ تابع $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$ می باشد . ب) دوره تناوب تابع $y = -3 \cos\left(\frac{\pi x}{\lambda}\right) - 2$ برابر است . ج) اگر بتوان مقادیر $f(x)$ را از هر عدد مثبت دلخواه بزرگتر کرد به شرط انکه x را با مقادیر بزرگتر از -2 به قدر کافی به -2 نزدیک اختیار کنیم در اینصورت می گوییم	۰/۷۵
۲	تابع $ x ^x$ در بازه $[a, -\infty)$ نزولی است حداکثر مقدار a را به دست آورید .	۰/۷۵
۳	یکی از معادلات زیر را حل کنید و جواب های عمومی آن معادله را تعیین نمایید . ۱) $\cos 2x - \sin x - \cos \pi = 1$ ۲) $\cos x(2\cos x - 1) = 0$	۱/۵
۴	حدود زیر را تعیین کنید . ۱) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{4x+1}{(2x+1)^2}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x-1}}{x^2 - x}$ ۳) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x$ ۴) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x + 7}{3x^3 + 5x + 2}$	۲
۵	مشتق توابع زیر را بدست آورید . (ساده کردن الزامی نیست) $f(x) = \left(\frac{x^2}{3x-1}\right)^5$, $g(x) = (x^2 + 1) + \sqrt{3x+2}$, $h(x) = \frac{x^2 - 4}{3x+1}$	۱/۵
۶	معادله حرکت متحرکی $g(t) = \frac{1}{2}t^2 - 3t + 1$ می باشد . ۱) تغییرات متوسط این متحرک در فاصله زمانی $[0, 4]$ را تعیین کنید . ۲) آهنگ تغییر آنی متحرک را در $t = 7$ بیابید .	۱/۲۵
۷	اگر $f(x)$ باشد تابع مشتق ، و دامنه آن را به دست آورید . $f(x) = \frac{1}{x-1}$	۰/۷۵
۸	ماکزیمم ، مینیمم مطلق تابع با ضابطه $f(x) = 2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 9}$ را در بازه $[1, 8]$ را محاسبه کنید .	۱/۷۵
۹	ماکزیمم مساحت ناحیه سایه خورده کدام است . 	۱/۵
۱۰	۱۶) نقاط $B'(-1, 4)$, $B(7, 4)$ دو سر قطر کوچک یک بیضی اند . اگر فاصله کانونی بیضی 4 باشد ، مختصات دو سر قطر اصلی کانون ها و خروج از مرکز بیضی را به دست آورید .	۱/۷۵
۱۱	وضعیت خط $x + y - 3 = 0$ نسبت به دایره $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ را مشخص کنید .	۱

۱/۲۵	دو دایره به معادلات: $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 6y + 6 = 0 \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 = 3 \end{cases}$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟	۱۲									
۰/۷۵	اگر یک لوزی با قطرهای ۱۰ و ۶ را حول قطر بزرگ آن دوران دهیم حجم شکل حاصل را محاسبه کنید.	۱۳									
۱	کارمندان اداره ای مطابق جدول زیر توزیع شده اند احتمال آن که کارمند مردی تحصیلات دانشگاهی داشته باشد چقدر است؟	۱۴									
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>زن</th> <th>مرد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تحصیلات دانشگاهی</td> <td>۱۵</td> <td>۲۵</td> </tr> <tr> <td>تحصیلات کمتر از دانشگاهی</td> <td>۷۵</td> <td>۹۵</td> </tr> </tbody> </table>		زن	مرد	تحصیلات دانشگاهی	۱۵	۲۵	تحصیلات کمتر از دانشگاهی	۷۵	۹۵	
	زن	مرد									
تحصیلات دانشگاهی	۱۵	۲۵									
تحصیلات کمتر از دانشگاهی	۷۵	۹۵									
۱/۵	سه جعبه یکسان داریم، در اولین جعبه ۱۲ مهره قرار دارد که ۴ تای آنها قرمز است و در جعبه دوم ۱۰ مهره وجود دارد که تمام آنها قرمزند و در جعبه سوم ۸ مهره قرار دارد که ۶ تای آنها قرمز است. به تصادف یکی از جعبه ها را انتخاب کرده و از آن یک مهره بیرون می آوریم. احتمال اینکه مهره انتخابی قرمز باشد را پیدا کنید.	۱۵									
۲۰	موفق باشید با مردم										

ردیف	پاسخ نامه	نمره
۱	الف) گزینه ۱ $y = (x-1)^2, x \leq 1 \Rightarrow \sqrt{y} = x-1 \Rightarrow \sqrt{y} = -x+1 \Rightarrow x = -\sqrt{y} + 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{x} + 1$ ب) ۱۶ $y = -2 \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) - 2, T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 16$ ج) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	
۲	 طبق شکل تابع در بازه $(-\infty, 0)$ نزولی است بنابراین حد اکثر مقدار a صفر است	
۳	۱) $\cos \pi = -1 \Rightarrow \cos 2x - \sin x + 1 = 0 \Rightarrow \cos 2x = \sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \Rightarrow 2x = 2k\pi \pm (\frac{\pi}{2} - x) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4k\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}$ ۲) $\cos x (\cos x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{2}, 2\cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$ غیر قابل حل	
۴	۱) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+1}{(2x+1)^2} = \frac{3}{9} = +\infty$ ۲) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x-1}}{x^2 - x} \times \frac{x + \sqrt{2x-1}}{x + \sqrt{2x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x(x-1)(2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x(x-1)(2)} = 0$ ۳) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan 2x \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan 2x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan 2x = +\infty \end{cases}$ ۴) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x + 7}{3x^3 + 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{3x^3} = \frac{2}{3}$	

$$f'(x) = \Delta \left(\frac{x^r}{rx-1} \right)^r \left(\frac{rx(rx-1)-r(x^r)}{(rx-1)^r} \right)$$

$$g'(x) = (rx^r) + \frac{r}{r\sqrt{rx+2}}$$

$$h'(x) = \frac{rx(rx+1)-r(x^r-1)}{(rx+1)^r}$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$\left(\sqrt[n]{u^m}\right)' = \frac{mu'}{n\sqrt[n]{u^{n-m}}}$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$1) \frac{g(r)-g(0)}{r-0} = \frac{-3-1}{r} = -1$$

$$2) g'(x) = t-3 \Rightarrow g'(r) = r-3 = 4$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2} \quad D_{f'} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$f(x) = r - \frac{1}{r}x + \frac{1}{r}\sqrt{x^r + 9} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{rx}{2\sqrt{x^r + 9}} = \frac{rx - \sqrt{x^r + 9}}{r\sqrt{x^r + 9}} = 0$$

$$rx - \sqrt{x^r + 9} = 0 \Rightarrow rx^r = x^r + 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt[3]{9}$$

x	1	$\sqrt{3}$	8
f(x)	$\frac{2\sqrt{10}+7}{4}$	$\frac{8+2\sqrt{3}}{4}$	$\frac{\sqrt{73}}{2}$


ماکریم مینیمم

اول معادله خط گذرا از A و B را می نویسیم.

$$L_{AB} : y - 0 = \frac{0 - 8}{8 - 0}(x - 8) \Rightarrow y = -x + 8$$

$$S = x \times y = x(-x + 8) = -x^2 + 8x \Rightarrow S'(x) = -2x + 8 = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$S(r) = -16 + 32 = 16$$



9

$$B'(-1, 4), B(7, 4) \Rightarrow O \begin{cases} \alpha = \frac{-1+7}{2} = 3 \\ \beta = \frac{4+4}{2} = 4 \end{cases} \Rightarrow BB' = 2b = \sqrt{(7+1)^2 + (4-4)^2} = 8 \Rightarrow b = 4$$

پیشیمون قائم

$$FF' = 4 \Rightarrow c = 2 \Rightarrow a = \sqrt{4^2 + 4^2} = 2\sqrt{5} \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$x^r + y^r - 2y - 3 = 0 \Rightarrow O \begin{cases} \alpha = \frac{0}{r} = 0 \\ \beta = \frac{r}{r} = 1 \end{cases}, R = \frac{1}{r}\sqrt{4+12} = 2, OH = \frac{|0+1-3|}{\sqrt{1^r+1^r}} = \sqrt{2} \Rightarrow R > OH \quad \text{متقطع اند}$$

10

$$O_1 \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = -3 \end{cases} \quad R_1 = \frac{1}{r}\sqrt{4+36-24} = 2, \quad O_2 \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases}, \quad R_2 = \sqrt{2}$$

$$|O_1 O_2| = d = \sqrt{(2+1)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{25} = 5 \quad R_1 + R_2 = 2 + \sqrt{2} < d = 5$$

مترابج هستند

11

$$V = 2 \left(\frac{\pi}{3} r^2 h \right) = 2 \left(\frac{\pi}{3} (2)^2 5 \right) = 20\pi$$

دو مخروط هم قاعده به ارتفاع 5 و شعاع 3 خواهیم داشت در نتیجه :

12

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{25}{25+95} = \frac{25}{120}$$

پیشامد دارا بودن تحصیلات دانشگاهی : A

13

$$p(j_1)p(g|j_1) + p(j_2)p(g|j_2) + p(j_3)p(g|j_3) = \frac{1}{3} \times \frac{4}{12} + \frac{1}{3} \times \frac{10}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{6}{8} = \frac{25}{36}$$

۲۰ جمع بارم

موفق باشید

14


مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲	رشته: تجربی	سوالات امتحان درس:
ساعت شروع:	تاریخ امتحان:	دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:

@kimia-mahan آزمون پنجم :

دانش آموزان سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	سوالات	ردیف
۱	اگر $g(x) = x^3$, $f(x) = \frac{x-24}{8}$ باشد مقادیر $(f \circ g)^{-1}(5)$, $(f \circ g)^{-1}(6)$ را تعیین کنید.	۱
۱	نمودار تابع معین $y = f(x)$ در شکل رو به رو داده شده است نمودار تابع $y = -\frac{1}{2}f(-2x) + \frac{1}{2}$ را رسم کنید و مراحل را توضیح دهید. 	۲
۱	نمودار تابع $f(x) = b(x-a)^3 + c$ به صورت مقابل است مقادیر a, b, c را به دست آورید. 	۳
۱/۵	جواب کلی معادله مثلثاتی: $\sin^3 x + 3 \cos x = 0$, کدام است؟ حدود زیر را محاسبه کنید	۴
۱/۵	۱) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{4x^3 + 6x^2 + 8}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{[2x] - 3}{ 4x + 1 }$ ۳) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^3 + x - 2}$	۵
۱	شیب خط مماس بر تابع $y = -x^3 + 10x$ را در نقطه ای به طول ۳ واقع بر منحنی تابع با استفاده از تعریف مشتق (محاسبه حد) به دست بیاورید و معادله خط مماس بر تابع را در این نقطه بنویسید.	۶
۱/۵	مشتق توابع زیر را بگیرید (ساده کردن الزامی نیست) $f(x) = \frac{-x}{2x^3 - x + 1}$ $g(x) = \left(\frac{x^3}{3x+1}\right)^5$ $h(x) = \sqrt{2 - \frac{1}{3x}}$	۷
۰/۷۵	با توجه به شکل تابع $f(x)$ و نقاط روی آن به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) طول نقاطی که مشتق صفر است. ب) طول نقاطی مقدار مشتق آن منفی است. پ) طول نقاطی که مشتق وجود ندارد. 	۸
۱	تابع $f(x) = 7\sqrt{x} + 5$ قدر متوسط کودکان را بر حسب سانتیمتر تا حدود ۶۰ ماهگی نشان می دهد که در آن x مدت زمان پس از تولد بر حسب ماه، آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی $[0, 25]$ و آهنگ لحظه ای در $x = 16$ را محاسبه کنید.	۹
۱/۷۵	تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x$ مفروض است الف) این تابع در چه بازه ای صعودی و در چه بازه ای نزولی است. ب) ماکریم و می نیمم مطلق آن را در بازه $[1, 4]$ را تعیین کنید	۱۰
۱/۵	می خواهیم یک استوانه فلزی در باز با حجم 24π سانتی متر مکعب بسازیم. شعاع قاعده استوانه را چقدر انتخاب کنیم تا فلز به کار رفته در ساخت استوانه کم ترین مقدار ممکن شود.	۱۱
۱	دایره C به مرکز $(-1, 2)$ و شعاع ۳ و دایره C' به معادله $0 = y^2 + 2x + 6y + 6$ نسبت به هم چگونه هستند.	۱۲
۱	معادله دایره ای را بنویسید که با دایره $0 = x^2 + y^2 - 4x + 8y = 0$ هم مرکز بوده و بر خط $0 = 2y - 3x + 1$ مماس باشد.	۱۳
۱	خروج از مرکز بیضی که $A' = \left(\frac{-1}{2}, 0 \right)$ راس کانونی و $B' = \left(0, \frac{3}{2} \right)$ راس غیر کانونی آن باشد، کدام است؟	۱۴
۱	ازین سه کارت سفید و ۴ کارت سبز یکسان به تصادف یک کارت بیرون می آوریم. بدون جای گذاری سپس کارت دوم را خارج می کنیم با کدام احتمال هر دو کارت همنگ هستند.	۱۵

۱/۵	در کیسه‌ای ۵ مهره قرمز و ۳ مهره آبی و در کیسه دوم ۴ مهره قرمز و ۵ مهره آبی داریم . تاسی را پرتاب می‌کنیم اگر عدد رو شده مضرب ۳ باشد از کیسه‌ای اول دو مهره و اگر مضرب ۳ نباشد از کیسه دوم ۲ مهره بر می‌داریم احتمال آنکه دو مهر همنه نباشند را محاسبه کنید .	۱۶
۱	<p>جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .</p> <p>الف) نمودار تابع $y = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ را می‌توان با واحد انتقال نمودار $y = x^3$ به سمت رسم کرد .</p> <p>ب) برای آن که تابع $f(x) = mx + n$ در تمام دامنه اش هم صعودی و هم نزولی باشد مقدار m باید برابر باشد .</p> <p>ج) اگر دوره تناب تابع $y = -3\cos(\frac{m-1}{3}x + 1)$ باشد مقدار m برابر است با</p> <p>د) اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 - 5x^3 + x - 2}{2x^m + 7x^3 - 6} = \frac{-1}{3}$ مقادیر a, m به ترتیب از راست به چپ : و می‌باشند</p>	۱۷
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

ردیف	پاسخ نامه تشریحی آزمون پنجم	نمره
۱	$g(x) = x^r \Rightarrow g^{-1}(x) = \sqrt[r]{x}, f(x) = \frac{x-24}{8} \Rightarrow f^{-1}(x) = 8x + 24$ $y = f(g(x)) = f(x^r) = \frac{1}{8}x^r - 3 \Rightarrow y + 3 = \frac{1}{8}x^r \Rightarrow x = \sqrt[8]{8(y+3)} \Rightarrow (fog)^{-1} = \sqrt[8]{8x+24}$ ۱) $(fog)^{-1}(x) = \sqrt[8]{8x+24} \Rightarrow (fog)^{-1}(5) = \sqrt[8]{8 \times 5 + 24} = \sqrt[8]{64} = 4$ ۲) $(f^{-1} \circ f^{-1})(6) = f^{-1}(f^{-1}(6)) = f^{-1}(8 \times 6 + 24) = f^{-1}(72) = 8 \times 72 + 24 = 600$	۱
۲		۲
۳	با توجه به نمودار تابع $y = x^3$ باید عبارت درجه ۳ در $x=1$ صفر شود و مختصات نقاط معلوم تابع باید در آن صدق کند . $(x-a)^r _{x=1} = (1-a)^r = 0 \Rightarrow a=1 \Rightarrow \begin{cases} f(1) = b(1-1) + c = 4 \Rightarrow c = 4 \\ f(0) = b(0-1) + c = 3 \Rightarrow -b + 4 = 3 \Rightarrow b = 1 \end{cases}$	۳
۴	$2\sin^r x + 3\cos x = 0 \Rightarrow 2(1-\cos^r x) + 3\cos x = 0 \Rightarrow 2\cos^r x - 3\cos x - 2 = 0$ $\cos x = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{4} = \frac{2 \pm 4}{4} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases} \Rightarrow \cos x = \frac{-1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$	۴

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^r + \lambda}{rx^r + sx^r + \lambda} = \frac{\circ}{\circ} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+r)(x^r - rx + s)}{r(x+r)(rx^r - x + s)} = \frac{1r}{2s} = \frac{1}{2}$$

$$\text{r) } \lim_{x \rightarrow \frac{-1}{\epsilon}} \frac{[rx] - r}{|rx + 1|} = \lim_{x \rightarrow \left(\frac{-1}{\epsilon}\right)^+} \frac{-1 - r}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{c}} [cx] = \left[\frac{-c}{c} \right]$$

اول تلیف قسمت برآلتی رو تعیین کن

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^{\gamma} + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^{\gamma} + x - 2} \times \frac{x + \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\gamma} - x}{(x-1)(x+1)(x+\sqrt{x})} = \frac{1}{2}$$

$$f'(r) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(r+h) - f(r)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(r+h)^2 + 10(r+h) - 21}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-9 - 8h - h^2 + 10r + 10h - 21}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h + f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-1 + f'(h)) = -1$$

$$A \begin{cases} x = r \\ f(r) = v \end{cases} \xrightarrow{f'(r)=\tau} L: y - v = \tau(x - r)$$

$$f(x) = \frac{-x}{x^r - x + 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{-1(x^r - x + 1) - (rx - 1)(-x)}{(x^r - x + 1)^r}$$

$$g(x) = \left(\frac{x^r}{rx+1} \right)^f \quad \Rightarrow \quad g'(x) = f \left(\frac{rx(rx+1) - (rx)x^r}{(rx+1)^2} \right) \left(\frac{x^r}{rx+1} \right)^{r-1}$$

$$h(x) = \sqrt{x - 1} \quad \rightarrow \quad h'(x) = \frac{1}{(x-1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$r\sqrt{r - \frac{1}{rx}}$$

$(\mathbf{u}\mathbf{v})' = \mathbf{u}'\mathbf{v} + \mathbf{v}'\mathbf{u}$	$\left(\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{v}}\right)' = \frac{\mathbf{u}'\mathbf{v} - \mathbf{v}'\mathbf{u}}{\mathbf{v}^2}$
$\left(\sqrt[n]{\mathbf{u}^m}\right)' = \frac{m\mathbf{u}'}{n\sqrt[n]{\mathbf{u}^{n-m}}}$	$(\mathbf{u} \pm \mathbf{v})' = \mathbf{u}' \pm \mathbf{v}'$

الف) b چون خط مماسیش افقی میشه
ب) d تابع در این نقاط نزولیه

پ) f , h چون: تابع در نقطه f ناپیوسته و مشتق ناپذیر و در h زاویه داره یعنی مشتق ناپذیره

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(\sqrt{\Delta}) - f(\circ)}{\sqrt{\Delta} - \circ} = \frac{(\sqrt{\sqrt{\Delta}} + \Delta\circ) - (\sqrt{\circ} + \Delta\circ)}{\sqrt{\Delta}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{\Delta} = \sqrt{\frac{1}{\Delta}} \quad , \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad f'(\sqrt{\Delta}) = \frac{1}{\sqrt{\Delta}}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x \Rightarrow f'(x) = x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2, x = 3$$

x	١	٢	٣	٤
$f'(x)$	+ ↘	- ↗	+ ↘	
$f(x)$	٤/٨	٤/٦	٤/٥	٥/٣

اول از تابع مشتق کرده قیمتی بعد نقاط بهارانی رو حساب کردیدم بعد مشتق رو با توجه به نقاط بهارانی تعیین علامت کردیدم تا یکنوانی تابع تعیین شود سپس مقدارهای تابع را برای ابتدا و انتهای یازده و نقاط بهارانی به دست آوردیدم پیشترین و کمترین مقدار تابع تعیین می شد .

$$V = \pi r^2 h = \gamma \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{\gamma \pi}{r^2}, \quad , \quad S = \gamma \pi r h + \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad S = \gamma \pi r \frac{\gamma \pi}{r^2} + \pi r^2 = \frac{\gamma^2 \pi^2}{r} + \pi r^2$$

$$S'_r = \frac{-4\lambda\pi}{r^2} + 2\pi r = 0 \quad \Rightarrow \quad r^3 = 24 \quad \Rightarrow \quad r = \sqrt[3]{24}$$

سطح جانبی استوانه سطح قاعده استوانه

سطح قاعده استوانه

$$\mathbf{o}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_1 = 3, \quad x^2 + y^2 + 2x + 6y + 6 = 0 \Rightarrow \mathbf{o}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_2 = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 36 - 24} = 2$$



$$|\mathbf{o}_x \mathbf{o}_y| = d = \sqrt{(-1+1)^2 + (-r-r)^2} = d = \Rightarrow \mathbf{R}_x + \mathbf{R}_y = d = d \Rightarrow$$

	<p>اول مرکز دایره رو از روی دایره داده شده تعیین می کنیم چون گفته هم مرکزند . بعد فاصله مرکز رو از خط مماس بدست می آوریم که همون شعاع دایره است</p> $\begin{cases} \alpha = \frac{4}{2} = 2 \\ \beta = \frac{-8}{2} = -4 \end{cases} \Rightarrow R = \frac{ 2(-4) - 2(2) + 1 }{\sqrt{(-3)^2 + (2)^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13} \Rightarrow (x-2)^2 + (y+4)^2 = 13$	۱۳
	<p>با توجه به شکل مرکز و طول قطر های بیضی تعیین می شود .</p> <p>قشنگ دقت کن روی قطر اصلی بیضی افقی عرض همه نقاط $y = \beta$ است و روی قطر فرعی طول همه نقاط با هم یکی و $x = \alpha$ است . پس</p> $x_O = x_B, y_O = y_A \Rightarrow O(3, 2) \Rightarrow OB' = b = 2, OA' = a = 4 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow c = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$ $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$	۱۴
	<p>یعنی هر دو کارت سفید یا هر دو کارت سبز باید باشند</p> $P = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$	۱۵
	<p>مفایرب ۳ یعنی $\{3, 6\}$ و غیر سه یعنی $\{1, 2, 4, 5\}$ پس درایم</p> $P = \frac{2}{6} \times \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{1}}{\binom{8}{2}} + \frac{4}{6} \times \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} = \frac{2}{6} \times \frac{15}{28} + \frac{4}{6} \times \frac{20}{36} =$	۱۶
۲۰	<p>الف) ۲ – به سمت چپ :</p> <p>ب) صفر : خطی افقی می شود که در تعریف صعودی و نزولی صدق می کند</p> <p>ج) ۵ : $T = \frac{\frac{2\pi}{m-1}}{\frac{m-1}{3}} = \frac{6\pi}{m-1} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow m-1=4 \Rightarrow m=5$</p> <p>(۵) $\frac{-2}{3}$: چون جواب حد عدد ناصفر شده باید صورت و مخرج هم توان باشند پس $m=4$ از طرفی</p> $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 - 5x^3 + x - 2}{2x^m + 7x^3 - 6} = \frac{ax^4}{2x^4} = \frac{a}{2} = \frac{-1}{3} \Rightarrow a = \frac{-2}{3}$	۱۷
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

سوالات امتحان درس:	رشته: تجربی	تعداد صفحه: ۲۰	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان:	ساعت شروع:
@kimia-mahan آزمون ششم :			دانش آموزان سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>الف) تابع $y = (x+1)^{ x+1 }$ در بازه $[-\infty, a]$ نزولی است. حداکثر مقدار a است.</p> <p>ب) باقی مانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای $f(x) = -2x^3 - 4x + 8$ بر $x+3$ برابر است با</p> <p>ج) اگر $k > 1$ باشد نمودار $y = kf(x)$ از نمودار $y = f(x)$ حاصل می‌شود.</p> <p>د) طول $x=0$ نسبی و مطلق تابع $f(x) = - x$ می‌باشد.</p>	
۲	دو تابع $g(x) = \sqrt{x-1}$, $f(x) = \frac{3x}{1-x^2}$ مفروض‌اند. دامنه‌ی تابع fog را بدون محاسبه‌ی ضابطه‌ی fog به دست آورید.	۱
۳	جواب‌های عمومی معادله مثلثاتی $\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) - 2\sin(\pi-x) + 1 = 0$ را به دست آورید.	۱
۴	<p>با توجه به نمودار تابع f حاصل حد‌های زیر را به دست آورید.</p>	۱
۵	<p>حاصل حدود زیر را به دست آورید.</p> <p>۱) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x - 2}{-2x^3 + x^2 + 3}$</p> <p>۲) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x - 10}{x^3 - 4x}$</p>	۰
۶	<p>مشتق توابع زیر را بگیرید. (ساده کردن الزامی نیست)</p> <p>۱) $f(x) = \sqrt{x}\left(\frac{1}{x}\right)$</p> <p>۲) $g(x) = (2x-3)^5(x^3+5x)$</p> <p>۳) $h(x) = \sqrt{5-7x}\left(4-\frac{x}{2}\right)$</p>	۰
۷	<p>اگر f, g, h توابع مشتق پذیر و $(f \times g)'(2) = 2$, $g'(2) = -3$, $3f'(2) = f(2) = 3$ باشند مقادیر $(\frac{g}{f})'(2)$ را به دست آورید.</p>	۱
۸	<p>نمودار تابع ای را رسم کنید که در تمام شرایط زیر صدق کند .</p> <p>الف) در $x = 0$ مشتق پذیر نباشد.</p> <p>ب) وقتی $x \rightarrow 2$ آنگاه $y \rightarrow -\infty$</p> <p>ج) مشتق آن در $x = 3$ برابر صفر باشد.</p>	۱
۹	<p>یک توده باکتری پس از t ساعت دارای جرم $k(t) = 2t^3 + \sqrt{t}$ گرم است. جرم این توده باکتری در بازه زمانی $4 \leq t \leq 0$ به طور متوسط چند گرم افزایش می‌یابد و تغییرات آنی آن در $t = 1$ را حساب کنید.</p>	۰/۷۵
۱۰	برای تابع $y = x ^2$ نقاط بحرانی و نوع اکسترمم‌های نسبی آن را تعیین کنید و در بازه $[-5, 3]$ ماکسیمم و مینیمم مطلق تابع را تعیین کنید.	۱/۵

۱/۲۵	اگر x , y دو متغیر مثبت به طوری که $2x + y = 64$ ماکزیمم مقدار xy را تعیین کنید.	۱۱
۱	جا های خالی را با عبارات مناسب پر کنید. الف - شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول وتر آن است. ب - اگر یک لوزی با طول قطر های ۶ و ۴ را حول قطر بزرگ آن دوران دهیم حجم شکل حاصل است.	۱۲
۱	خروج از مرکز یک بیضی افقی $\frac{4}{5}$ ، مرکز آن $(-4, -1)$ و طول قطر کوچک این بیضی ۶ واحد است. مختصات دو سرقطر بزرگ بیضی را پیدا کنید.	۱۳
۱	معادله دایره ای به شعاع ۲ باشد f را محاسبه کنید.	۱۴
۱	معادله دایره ای که مرکزش نقطه $w(3, -1)$ و از خط $2x - 5y + 18 = 0$ وتری به طول ۶ جدا کند را بنویسید.	۱۵
۱/۵	%۴۰ کارکنان یک شرکت را مردان و %۶۰ زنان تشکیل می دهند %۲۰ مردان و %۳۵ زنان تحصیلات دانشگاهی دارند. فردی به تصادف انتخاب می کنیم احتمال آن که فرد مورد نظر تحصیلات دانشگاهی داشته باشد را تعیین کنید.	۱۶
۱	اگر $P(A \cup B) = 0/1$, $P(A) = 0/2$, $P(B A) = 0/1$ باشد، آن گاه $P(B)$ را بیابید.	۱۷
۲۰	جمع موفق باشید	بارم

ردیف	پاسخ نامه تشریحی آزمون ششم	نمره
۱	<p>الف) $f(x) = -2x^2 - 4x + 8 \Rightarrow R = f(-3) = -2(9) - 4(-3) + 8 = 2$</p> <p>ب) ۲ چون $k > 1$ و پشت f است انبساط عرضی داریم</p> <p>ج) انبساط عرضی یا کشش عرضی: چون $k < 1$ بزرگتر از ۱ است انبساط عرضی داریم</p> <p>د) ماکریم</p> 	-۱
۲	<p>$g(x) = \sqrt{x-1}$, $f(x) = \frac{3x}{1-x} \Rightarrow D_g = [1, +\infty)$, $D_f = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$</p> <p>$D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \left\{x \in [1, +\infty) \mid \sqrt{x-1} \neq \pm 1\right\} = [1, +\infty) - \{2\}$</p> <p>$\sqrt{x-1} \neq 1 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 1 \Rightarrow x = 2$</p> <p>$\sqrt{x-1} \neq -1 \Rightarrow$ غیر ممکنه</p>	۲
۳	<p>$\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) - 2\sin(\pi-x)+1=0 \Rightarrow -\sin x(-\sin x) - 2\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \sin^2 x - 2\sin x + 1 = 0$</p> <p>$(\sin x - 1)^2 = 0 \Rightarrow \sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$</p>	۳
۴	<p>۱) $\lim_{x \rightarrow \infty^-} f(x) = -1$</p> <p>۲) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$</p> <p>۳) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -2$</p> <p>۴) $\lim_{x \rightarrow 0^-} [f(x)] = [-1^-] = -2$</p>	۴
۵	<p>۱) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - 2}{-2x^2 + x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-2x^2} = \frac{-1}{2}$</p> <p>۲) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 10}{x^2 - 4x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+5)}{x(x-4)} = \frac{10}{8}$</p>	۵
۶	<p>۱) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{x} \right) + \sqrt{x} \left(\frac{-1}{x^2} \right)$</p> <p>۲) $g'(x) = 2(2)(2x-2)^2 (x^2 + \Delta x) + (2x+\Delta)(2x-2)^2$</p> <p>۳) $h'(x) = \frac{-1}{\sqrt{\Delta - \Delta x}} \left(2 - \frac{x}{\Delta} \right) + \left(\frac{-1}{\Delta} \right) \sqrt{\Delta - \Delta x}$</p>	۶
۷	<p>$g'(2) = 2$, $g(2) = -2$, $gf'(2) = f(2) = 2$</p> <p>$(f \times g)'_r = f'_r \times g_r + g'_r f_r = \frac{2}{r}(-2) + 2(2) = \frac{2}{r}$</p> <p>$\left(\frac{f}{g}\right)'_r = \frac{f'_r \times g_r - g'_r f_r}{(g_r)^2} = \frac{\frac{2}{r}(-2) - 2(2)}{r^2} = \frac{-24}{r^2} = \frac{-24}{4} = -6$</p>	۷
۸		۸
۹	<p>$\frac{k(r)-k(0)}{r-0} = \frac{(2(r))^2 + \sqrt{r}}{r} - 0 = \frac{12}{r}$</p> <p>$k'(t) = rt^2 + \frac{1}{\sqrt{t}} \Rightarrow k'(1) = r + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$</p>	۹

$$y = |x| - 2 = \begin{cases} -x - 2 & x < -2 \\ -(x-2) & -2 \leq x < 0 \\ -(x-2) & 0 \leq x \leq 2 \\ x - 2 & x > 2 \end{cases} \Rightarrow y' = \begin{cases} -1 & x < -2 \\ 1 & -2 \leq x < 0 \\ -1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \{-2, 0, 2\}$$

نقاط بحرانی تابع


x	-5	-2	0	2	3
$f'(x)$	- ↘	+ ↗	- ↘	+ ↗	
$f(x)$	3	0	2	0	1

ماکسیمم مینیمم مینیمم

$$2x + y = 64 \Rightarrow p = xy = x(64 - 2x) = 64x - 2x^2 \Rightarrow p'_{(x)} = 64 - 4x = 0 \Rightarrow x = 16$$

$$p(16) = 16(64 - 2(16)) = 512$$

الف) دو مخروط هم قاعده و شعاع قاعده



$$2 \left(\frac{\pi}{3} (2)^2 (3) \right) = 8\pi$$

$r = 2$ در نتیجه داریم :

$$O \left| \begin{array}{l} \alpha = -4 \\ \beta = -1 \end{array} \right. , \quad b = 3 , \quad e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} \Rightarrow a^r = b^r + c^r \Rightarrow 1 = \left(\frac{b}{a}\right)^r + \left(\frac{c}{a}\right)^r \Rightarrow \frac{3}{a} = \sqrt[1]{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5} \Rightarrow a = 5 , \quad c = 4$$


از راه اعداد فیثاغورسی هم میشود حدس زد

$$A \left| \begin{array}{l} \alpha + a = -4 + 5 = 1 \\ \beta = -1 \end{array} \right. \quad A' \left| \begin{array}{l} \alpha - a = -4 - 5 = -9 \\ \beta = -1 \end{array} \right.$$


$$R = \frac{1}{2} \sqrt{a^r + b^r - 4c} \Rightarrow 2 = \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^r + (-6)^r - 4f} \Rightarrow 4 = \sqrt{40 - 4f} \Rightarrow 16 = 40 - 4f \Rightarrow f = 6$$

خطی که از مرکز دایره بر وتر وارد و بر آن عمود باشد، آن را نصف می کند.

$$OH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^r + b^r}} = \frac{|2(3) - 5(-1) + 18|}{\sqrt{4 + 25}} = \frac{29}{\sqrt{29}} \Rightarrow OH = \sqrt{29}$$



$$R^r = OH^r + (2)^r = 29 + 9 = 38 \Rightarrow R = \sqrt{38} \Rightarrow (x-2)^r + (y+1)^r = 38$$



$$p(D) = p(M)p(D|M) + p(Z)p(D|Z) = \frac{20}{100} \times \frac{20}{100} + \frac{60}{100} \times \frac{35}{100}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A) = 0/2 , \quad P(B|A) = 0/1 = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = 0/1 \times 0/2 = 0/02 \\ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A) = 0/6 + 0/02 - 0/02 = 0/42 \end{array} \right.$$

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

تعداد صفحه: ۱

رشته: تجربی

سوالات امتحان درس:

ساعت شروع:

تاریخ امتحان:


دوره دوم متوسطه

نام و نام خانوادگی:

@kimia – mahan آزمون هفتم :


دانش سراسر کشور در نوبت خود داد ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	سوالات	نمره
۱	درستی و نادرستی جملات زیر را بررسی کنید. الف) اگر $f(x)$ تابعی یک به یک باشد آنگاه $(x)^{-1}$ لزوماً تابعی یک به یک نیست. ب) هر نقطه اکسترم نسبی، یک نقطه بحرانی است. ج) تابع تائزات در هر بازه ای که در آن تعریف شده باشد اکیداً صعودی است. د) هرگاه استوانه قائم را با یک صفحه قطع دهیم بطوری که صفحه مایل باشد مقطع حاصل بیضی است.	۱
۲	اگر $1 - 2x$ ، $g(x) = 3x^2 + x - 5$ باشند جواب معادله $fog = -5$ را به دست آورید.	۱
۳	اگر 1 در بازه $(-\infty, a]$ $f(x) = x^2 - 6x - 1$ اکیداً نزولی باشد، حد اکثر مقدار a را بیابید.	۱
۴	جواب های معادله $\sin 3x - \sin 2x = 1 + \cos \pi$ را تعیین کنید.	۱/۵
۵	حدود زیر را محاسبه کنید.	۱/۵
۶	مشتق توابع زیر را بگیرید. (ساده کردن الزامی نیست) $f(x) = \sqrt{3x+2}(x^2+1)^3$ $g(x) = \frac{-3x+2}{x^2-3x+1}$ $h(x) = \sqrt[3]{x-1} + \frac{2}{x} - x^2 + 2x - 1$	۲
۷	نقاط $1 + h$ روی نمودار تابع $y = x^2 + 3x + 1$ قرار دارند حد شیب خط گذرا از این دو نقطه وقتی که $h \rightarrow 0$ را محاسبه کنید.	۱
۸	ضرائب a, b, c را در تابع $y = -x^2 + ax + b$ چنان تعیین کنید که نقطه $(1, 2)$ ماقزیمم نسبی تابع باشد.	۱
۹	نقاط بحرانی تابع با ضابطه $y = (x^2 - 3x^2)^{\frac{1}{2}}$ را بیابید.	۱
۱۰	ماکزیمم و می نیمم مطلق تابع $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 6$ را در بازه $[-2, 3]$ تعیین کنید.	۱/۵
۱۱	ماکزیمم محیط از مستطیل هایی که یک ضلع آن منطبق بر محور x ها و دو راس آن بر روی منحنی تابع $y = x^2 - 6$ قرار دارد را تعیین کنید. 	۱/۵
۱۲	معادله دایره ای بنویسید که مرکز آن $(-1, -1)$ و با دایره: $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 3$ مماس درون باشد.	۱/۵
۱۳	در یک بیضی مختصات دو سر قطر بزرگ $A(-1, 2)$ ، $A'(9, 2)$ است. اگر فاصله دو راس فرعی بیضی برابر ۸ باشد خروج از مرکز و مختصات دو سر قطر کوچک بیضی را محاسبه کنید.	۱/۵
۱۴	یک سکه را پرتاب می کنیم اگر پشت بیاید ۳ سکه دیگر را با هم پرتاب می کنیم در این آزمایش احتمال اینکه دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود چقدر است؟	۱
۱۵	دو کیسه یکسان داریم کیسه اول ۴ مهره سفید و ۶ مهره سیاه و کیسه دوم شامل ۵ مهره سفید و ۷ مهره سیاه است از کیسه اول به تصادف یک مهره بر می داریم و در کیسه دوم قرار می دهیم سپس یک مهره از کیسه دوم انتخاب می کنیم با چه احتمالی این مهره سفید است؟	۱/۵
۱۶	الف) اگر صفحه p با مولد سطح مخروطی موازی باشد و از راس آن عبور نکند شکل حاصل است (۱) هذلولی (۲) دایره (۳) سهمی (۴) بیضی ب) یک مستطیل به طول ۵ و عرض ۴ را حول عرض آن دوران می دهیم؛ حجم جسم حاصل کدام است؟ $121\pi/4$ $100\pi/3$ $81\pi/2$ $64\pi/1$	۱
۲۰	جمع بارم	موفق باشید

ردیف	نمره	پاسخ نامه تشریحی آزمون ۷											
۱		الف) نادرست ب) درست ج) درست د) درست											
۲		$f(x) = 1 - 2x, g(x) = 3x^2 + x - 1 \Rightarrow fog(x) = 1 - 2(3x^2 + x - 1) = -6x^2 - 2x + 3 = -5$ $-6x^2 - 2x + 3 = -5 \Rightarrow 6x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 1, x = \frac{-8}{6} = \frac{-4}{3}$											
۳		راس سهمی : $f(x) = x^2 - 6x - 1 \Rightarrow x = \frac{-B}{2A} = \frac{6}{2} = 3$ بنابراین تابع در بازه $A = [1, \infty)$ نزولی است و در بازه $[3, +\infty)$ صعودی است در نتیجه حد اکثر مقدار $a = 3$ خواهد بود . 											
۴		$\sin 3x - \sin x = 1 + \cos \pi \Rightarrow \sin 3x - \sin x = 0 \Rightarrow \sin 3x = \sin x \Rightarrow \begin{cases} 3x = k\pi + x \\ 3x = k\pi + \pi - x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{k\pi + \pi}{4} \end{cases}$											
۵		۱) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \times \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{4}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{[x] - 2}{ 2x + 1 } = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-1 - 2}{ 2x + 1 } = \frac{-3}{0^+} = -\infty$ ۳) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x}{4 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x} = \frac{x}{-1} = +\infty$											
۶		۱) $f(x) = \sqrt{3x+2}(x^2+1)^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+2}}(x^2+1)^2 + 2(3x^2)(x^2+1)\sqrt{3x+2}$ ۲) $g(x) = \frac{-3x+2}{x^2-3x+1} \Rightarrow g'(x) = \frac{-3(x^2-3x+1) - (2x-3)(-3x+2)}{(x^2-3x+1)^2}$ ۳) $h(x) = \sqrt[3]{x-1} + \frac{2}{x} - x^2 + 2x - 1 \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}} - \frac{2}{x^2} - 2x + 2$											
۷		$f(x) = x^2 + x \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + (1+h) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+3)}{h} = 3 = f'(1)$ عمل مشتق تابع در نقطه $x = 1$ رو می خواهد که باید از راه تعریف مشتق ببریم											
۸		اولاً مختصات نقطه $(1, 2)$ باید در تابع صدق کند و ثانیاً طول این نقطه باید مشتق اول تابع را صفر نماید. $f(x) = -x^2 + ax + b \Rightarrow \begin{cases} f(1) = -1 + a + b = 2 \\ f'(x) = (-2x + a) _{x=1} = 0 \end{cases} \Rightarrow a + b = 3 \Rightarrow b = -1$											
۹		$y = (x^2 - 3x^2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow y' = \frac{2x^2 - 6x}{2\sqrt{(x^2 - 3x^2)^2}} \Rightarrow \begin{cases} y' = 0 \quad 2x(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3 \\ \text{کجا وجود ندارد} \quad x^2 - 3x^2 = x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3 \end{cases}$											
۱۰		$f(x) = 2x^2 - 9x^2 + 12x + 6 \Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 2$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>x</td><td>-2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>-70</td><td>11</td><td>10</td><td>15</td></tr></table> مینیمم مطلق ماکسیمم مطلق	x	-2	1	2	3	f(x)	-70	11	10	15	
x	-2	1	2	3									
f(x)	-70	11	10	15									

$$S = 2xy = 2x\sqrt{6-x^2} \Rightarrow S'(x) = 2\left(\sqrt{6-x^2} + x \frac{-2x}{2\sqrt{6-x^2}}\right) = 2\left(\frac{6-x^2-x^2}{\sqrt{6-x^2}}\right) = 0$$

$$6-2x^2=0 \Rightarrow x=\pm\sqrt{3} \Rightarrow S_{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \times \sqrt{6-3} = 6$$



۱۱

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0, \\ O \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{4}{2} = 2 \\ \beta = \frac{6}{2} = 3 \end{cases} \Rightarrow R_1 = \frac{1}{2}\sqrt{16+36+12} = 4, |O_1O_2| = d = \sqrt{(2+1)^2 + (3+1)^2} = 5$$

$$d = |R_2 - R_1| = |R_2 - 4| = 5 \quad R_2 = 9 \quad \Rightarrow (x+1)^2 + (y+1)^2 = 81$$

۱۲

$$O \begin{cases} \frac{9-1}{2} = 4 \\ 2 \end{cases} \Rightarrow |A'A| = 2a \Rightarrow |9 - (-1)| = 2a \Rightarrow a = 5, \quad 2b = 8 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}, \quad B' \begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta - b = 2 - 4 = -2 \end{cases} \quad B \begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta + b = 2 + 4 = 6 \end{cases}$$

۱۳

$$S = \{r, pppp, pppr, pprp, prpp, prrp, prpr, prrr, prrr\}$$

$$A = \{r, pppr, pprp, prpp\}$$

می‌دونی که پرتاپ هر سکه از سکه دیگر مستقله به خاطر همین برای محاسبه، احتمال‌ها شونو رو در هم ضرب می‌کنیم

$$P(A) = \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 3\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{11}{16}$$

۱۴

مهره انتقاب شده از بجهه اول یاسفید است با احتمال $p(w) = \frac{4}{10}$ و یا سیاه با احتمال $p(b) = \frac{6}{10}$ از طرفی پیشامد انتقاب مهره سفید از بجهه دو^۳ را با

نشان می‌دهیم و داریم $p(A|b) = \frac{5}{13}$ ، $p(A|w) = \frac{6}{13}$

$$p(A) = p(w)p(A|w) + p(b)p(A|b) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{13} + \frac{6}{10} \times \frac{5}{13}$$

۱۵

۳)

الف)

الف) شکل حاصل سهمی است.


ب) حجم حاصل یک استوانه به شعاع ۵ و با ارتفاع ۴ خواهد بود.

$$V = \pi(r)^2 h = \pi(5)^2 4 = 100\pi$$

۲۰ جمع‌بازم

موفق باشید

۱۶



ریاضیات به سبک روحانی



« ورود به سایت

بانک جزوات
دیجی کنکور



وبسایت دیجی کنکور، بزرگترین مرجع جزوات از ابتدایی تا کنکور

دیجی کنکور
رسانه دانش آموزان موفق
DigiKonkur.com